



آپ کے لمفیٹک میپنگ کے طریقہ کار کے بارے میں

یہ معلومات MSK میں آپ کے لمفیٹک (lim-FA-tik) میپنگ کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہیں۔

اگر آپ کو چھاتی کا سرطان یا میلانوما (جلد کے سرطان کی ایک قسم) ہے تو یہ طریقہ کار کیا جاسکتا ہے۔ اس سے آپ کے ڈاکٹر کو یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ آیا سرطان کے خلیات رسولی سے بڑھ کر آپ کی لف نوڈز تک پھیل چکے ہیں یا نہیں۔


آپ کے جسم میں لمفیٹک نظام اور لف نوڈز کے مقامات کے بارے میں

آپ کے لمفیٹک نظام کے دو بنیادی کام ہیں:

یہ انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔

یہ جسم کے مختلف حصوں سے اضافی رطوبت کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔

Lymph nodes
Lymph vessels



آپ کا لمفی نظام لف نوڈز، لمفیٹک نالیوں، اور لمفیٹک رطوبت پر مشتمل ہوتا ہے (شکل 1 اور 2 دیکھیں)۔


• لف نوڈز چھوٹی، لوبیا نما غدود ہوتی ہیں جو لمفیٹک نالیوں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ لف نوڈز لمفیٹک رطوبت کو فلٹر کرتی ہیں اور اس میں سے سیلکٹیریا، وائرس، سرطان کے خلیات، اور دیگر فاصلہ مادوں کو الگ کرتی ہیں۔

شکل 1- آپ کی چھاتی میں موجود لمفیٹک نظام

○ سینٹینل (SEN-tih-nul) لف نوڈ وہ پہلی لف نوڈ ہوتی ہے جہاں سرطان کے خلیات عموماً سب سے پہلے پھیلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پہلی لف نوڈ ہے جس میں رسولی کا مائع خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ سینٹینل لف نوڈز بھی ہو سکتی ہیں جن میں رسولی کا اخراج ہوتا ہے۔ سینٹینل لف نوڈ کو سینٹینل لف نوڈ بھی کہا جاتا ہے۔

• لمفیٹک نالیاں باریک نالیاں ہوتی ہیں (بالکل خون کی نالیوں کی طرح) جو لمفی رطوبت کو لف نوڈز تک اور وہاں سے واپس لے جاتی ہیں۔

- لیفٹیک رطوبت ایک شفاف مائع ہے جو آپ کے لیفٹیک نظام میں گردش کرتی ہے۔ یہ ایسے خلیات کو منتقل کرتی ہے جو انفیکشن اور دیگر بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔



شکل 2- آپ کے جسم کے دیگر حصوں میں موجود لیفٹیک نظام

آپ کے لیفٹیک سپنگ کے طریقہ کار کے بارے میں

لیفٹیک سپنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں رسولی کے مقام کے قریب جلد کے نیچے ایک تابکار مائع انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تابکار مائع آپ کی لیفٹیک رطوبت کے ساتھ سفر کرتا ہے اور آپ کے لیفٹیک نظام کا ایک "نقشہ" تیار کرتا ہے۔ نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی سیسٹینل لمف نوڈز کہاں واقع ہیں۔ تاہم، یہ یہ نہیں بتاتا کہ آیا سرطان کے خلیات آپ کی سیسٹینل لمف نوڈز تک پھیل چکے ہیں یا نہیں۔

لیفٹیک سپنگ کا طریقہ کار عموماً 1 سے 2 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اپنے اپائنٹمنٹ ریمانڈر میں دیکھیں کہ سپنگ کے طریقہ کار کے لیے آپ کو کہاں جانا ہے۔

آپ کے لیفٹیک سپنگ کے طریقہ کار کے دن

سپنگ کے دوران آپ تقریباً 20 منٹ تک ایک ری لائننگ چیئر (پچھلی طرف جھکنے والی گرسی) پر لیٹیں گے۔ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا آپ کو Tc-99m نامی تابکار مائع کا انجیکشن (ٹیک) دے گا۔

وہ رسولی کے مقام کے قریب جلد کے نیچے اس تابکار مائع کی تھوڑی مقدار انجیکٹ کریں گے۔ یہ جگہ آپ کے سرطان کی قسم کے مطابق آپ کی چھاتی، بغل (ایگزیرا)، یا ران کے ارد گرد ہو سکتی ہے۔ انجیکشن کے دوران آپ کو چھن یا جلن

محسوس ہو سکتی ہے۔

انجیکشن کے بعد آپ 10 منٹ تک انجیکشن والی جگہ کو آہستگی سے مالش (ہلکے ہاتھ سے رگڑ) کریں گے۔ اس سے تابکار مائع کو آپ کی لیمنفٹک رطوبت کے ذریعے آپ کی سینٹینل لمف نوڈز تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔

اس کے بعد ایک ٹیکنالوجسٹ آپ کے جسم میں انجیکٹ کیے گئے تابکار مائع کی تابکاری کی مقدار کی پیمائش کرے گا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کن لمف نوڈز نے تابکار مائع جذب کیا اور کتنی مقدار جذب کی۔ جو لمف نوڈز سب سے زیادہ تابکار مائع جذب کرتی ہیں، وہی سینٹینل لمف نوڈز ہوتی ہیں۔

تابکاری کی پیمائش کرنے کے دو طریقے ہیں:

- ایک چھوٹا ہاتھ میں پکڑا جانے والا آلہ استعمال کرنا جسے Neoprobe® کہا جاتا ہے۔
- نیوکلیئر میڈیسن اسکین کروانا۔ یہ ایک تصویری اسکین ہے جو ایک بڑی مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے جس پر آپ لیٹے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے "نیوکلیئر میڈیسن اسکین" والا حصہ پڑھیں۔

دونوں طریقے تابکاری کی پیمائش کے لیے مؤثر ہیں۔ آپ کا صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا آپ کو بتائے گا کہ کیا توقع رکھنی چاہیے۔

نیوکلیئر میڈیسن اسکین

اگر انجیکشن کے بعد آپ کا نیوکلیئر میڈیسن اسکین ہونا ہے تو ٹیکنالوجسٹ آپ کو اسکیننگ روم میں لے جائے گا۔ آپ ایک میز پر لیٹیں گے جبکہ ٹیکنالوجسٹ تصاویر لے گا۔

ہر تصویر مکمل ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں، اور اس دوران آپ کو بالکل ساکن رہنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک ہی حالت میں 2 منٹ تک بالکل ساکن رہنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ اگر آپ کو بے آرامی محسوس ہو تو اپنے ٹیکنالوجسٹ سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے باقی وقت کی کتنی کرتا رہے۔ اسکین مکمل ہونے میں تقریباً 10 منٹ لگیں گے۔

تصاویر تابکار مائع کے بہاؤ کو ظاہر کریں گی۔ یہ یہ بھی دکھائیں گی کہ کن لمف نوڈز نے اس مائع کو جذب کیا۔ اس طرح آپ کے لیمنفٹک نظام کا ایک "نقشہ" تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کا سرجن اسی نقشے کی مدد سے آپ کی سینٹینل لمف نوڈز تلاش کرے گا۔

آپ کے لیمنفٹک میپنگ کے طریقہ کار کے بعد

بعض افراد کا میپنگ کے اسی دن ایک اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ اسے سینٹینل لمف نوڈ بائوپسی کہا جاتا ہے۔ بائوپسی کے دوران، آپ کا سرجن میپنگ کے طریقہ کار سے تیار کردہ نقشے کی مدد سے آپ کی سینٹینل لمف نوڈز تلاش کرے گا۔ وہ آپ کی سینٹینل لمف نوڈز نکال کر انہیں سرطان کے خلیات کی جانچ کے لیے لیبارٹری بھیج دے گا۔

اگر آپ کی بائوپسی اسی دن ہونی ہے تو عملے کا ایک رکن آپ کو بائوپسی کے کمرے تک لے جائے گا۔

اگر باپوسی اسی دن نہیں ہونی، تو مپنگ کے طریقہ کار کے بعد آپ کھر واپس جا سکیں گے۔

تابکاری سے حفاظت

آپ کے مپنگ کے طریقہ کار کے بعد آپ کے جسم سے تابکاری کی بہت معمولی مقدار خارج ہوگی۔ یہ مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ کو تابکاری سے متعلق کسی خاص احتیاطی تدابیر (حفاظتی اقدامات) پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس کا مطلب ہے کہ مپنگ کے طریقہ کار کے فوراً بعد آپ دوسروں کے قریب محفوظ طریقے سے رہ سکتے ہیں، جن میں حاملہ افراد اور بچے بھی شامل ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، انہیں بوسہ دے سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، گود میں اٹھا سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ آپ فوراً اپنی معمول کی سرگرمیوں میں واپس جا سکتے ہیں۔

بعض حفاظتی آلات (جیسے ہوائی ادوں یا سرنگوں کے باہر نصب سیکیورٹی نظام) تابکاری کی نہایت معمولی مقدار کو بھی شناخت کر سکتے ہیں۔ غمگاہی کا ایک رکن آپ کو ایک والٹ کارڈ دے گا جس میں درج ہوگا کہ آپ کو تابکار دوا دی گئی تھی۔ اس کارڈ میں یہ بتایا جائے گا کہ طریقہ کار کے بعد تین دن تک آپ کے جسم سے معمولی مقدار میں تابکاری خارج ہو سکتی ہے۔ اگر کسی چیک پوائنٹ پر قانون نافذ کرنے والے اہلکار آپ کو روکیں تو یہ کارڈ انہیں دکھائیں۔

24 گھنٹے تک دودھ پلانا بند رکھیں

اپنے مپنگ کے طریقہ کار کے بعد 24 گھنٹے (ایک دن) تک بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ دودھ نکال سکتی ہیں، لیکن وہ دودھ اپنے بچے کو نہ پلائیں۔ اور اسے پھینک دیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ دوبارہ دودھ پلانا شروع کر سکتی ہیں۔

اگر آپ کو تابکاری سے حفاظت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پیر سے جمعہ، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک 212-639-7391 پر کال کریں۔

اگر آپ کا کوئی سوال یا خدشہ ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ آپ کی نگہداشتی ٹیم کا ایک رکن پیر سے جمعہ ان اوقات کے مطابق جواب دے گا صبح 9 بجے سے شام 5 بجے ان اوقات کے علاوہ، آپ ایک پیغام چھوڑ سکتے ہیں یا کسی اور MSK معالج سے بات کر سکتے ہیں۔ کال پر ایک ڈاکٹر یا نرس ہمیشہ کال پر ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو 212-639-2000 پر کال کریں۔

مزید وسائل کے لیے، www.mskcc.org/pe پر جا کر ہماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں۔

About Your Lymphatic Mapping Procedure - Last updated on July 31, 2023
تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ ہیں