

# פעדיעטריק אדווענסט קעיר טיעם (PACT) אנווייזונגען פאר נעמען אפיאוידס

דעם ריסארס אינהאלט וויכטיגע אינפארמאציע איבער PACT און נעמען אפיאוידס אויף א זיכערן אופן. אין דעם ריסארס, וועלן די ווערטער "איר" און "איינערע" זיך ווענדן צו אייך אדער אייער קינד.

## PACT's צוגאנג צו ווייטאג

אונז שטעלן צו א ווייטאג מענעדזשמענט פלאן פאר איר אין אייערע סארט ווייטאג דער בעסטע וועג צו בעהאנדלען ווייטאג איז צו נוצן פארשידענע כלים. מעדיצינען זענען נאר איינער פון די פולע כלים מיר נוצן. מיר אויך נוצן פיזיש און אַקיאַפּיִישאַנאַל טעראַפּיע, מענטאַל געזונט טריטמאַנץ, פּראָסידזשערז, און ינטעגראַטיוו מעדיצין און וועללנעסס טריטמאַנץ.

## מענעדזשען ווייטאג מיט אפיאוידס

אפיאוידס זענען שטארקע ווייטאג מעדעצינען געוואנדן אויף צו העלפן מיט געוויסע סארטן ווייטאגן. אלע אפיאוידס ארבעטן אין ענדליכע וועגן און האבן ענדליכע זייטיגע ווירקונגען. שארט-אקטינג אפיאוידס ארבעטן פאר 3 ביז 4 שעה. לאנג-אקטינג אפיאוידס ארבעטן לענגער.

עטליכע געווענטליכע פרעסקרייבד אפיאוידס זענען:

- Morphine: Duramorph® (שארט-אקטינג), MS Contin® (לאנג-אקטינג)
- Oxycodone: Oxycontin® (לאנג-אקטינג), Xtampza ER® (לאנג-אקטינג)
- Hydromorphone: Dilaudid® (שארט-אקטינג), Exalgo® (לאנג-אקטינג)
- Fentanyl: Actiq® (שארט-אקטינג), Fentora® (שארט-אקטינג), Duragesic® (לאנג-אקטינג)
- Methadone (לאנג-אקטינג): Dolophine®

אפיאוידס זענען נישט די ריכטיגע מעדעצין פאר יעדער סארט ווייטאג. מיר וועלן דיר געבן די מעדעצינען וואס ארבעט דאס בעסטע פאר די סארט ווייטאג איר האט.

## אפיאוידס זייטיגע ווירקונגען

אפיאוידס קענען זיין זייער הילפבאר, אבער זיי קומען מיט וויכטיגע זייטיגע ווירקונגען און זיכערהייט זארגן. א PACT פראוויידער וועט רעדן מיט דיר איבער די ריזיקעס און בענעפיטן פאר איר הייבט אן

דאס זענען די מערסט באקאנטע זייטיגע ווירקונגען:

- קאנסטיפעישאן (ארויסגיין ווייניגער ווי געווענליך)
- קראצעניש איבער אייער גאנצע קערפער
- איבל (מען שפירט אַז מען גייט ברעכן)
- ברעכן
- פילן שלאפעדיג
- פילן שווינדלונג אדער שוואכקייט אין קאפ

דאס זענען ווייניגער באקאנטע זייט ווירקונגען:

- געשוועלאכץ אין אייער פיס
- שוועריגקייט מיט אטעמען
- שוועריקייט מיטן טראכטן קלאר
- פארלירן קאארדינאציע (שוועריקייטן מיט קאנטרעלירן טיילן פון דיין קערפער)
- נידריגע שטאפלן פון עסטראָגען און טעסטאָסטעראָן (רעפראדאקטיווע הארמאונס)
- זכרון פראבלעמען
- פלוצעמדיגע היצן אדער טרייסלונגען

אפיאוידיס קען אויך גורם זיין טאלארענץ, אנגעוואנדנהייט, צוריקצואונג, און סובסטאנץ באנוץ דיסארדער (אדיקשאן).

## **אפיאוידיס טאלארענץ, אנגעוואנדנהייט, און צוריקצואונג**

טאלארענץ ווען דיין קערפער ווערט צוגעוויינט צו א מעדעצין. ווען דאס געשעט, דארפט איר א העכערע דאזע (מאס) צו באקומען די זעלבע רעזולטאט. דאס פאסירט געווענליך נאך נוצן אפיאוידיס פאר א לאנגע צייט.

אנגעוואנדנהייט ווען דיין קערפער איז אזוי צוגעוויינט צו א מעדעצין אז עס קען גורם זיין סימפטאמען. ווען דאס פאסירט, האט איר אומבאקוועמע סימפטאמען אויב איר סטאפט נעמען א מעדעצין פלוצלונג אדער איר נידערט אייער דאזע צו שנעל. דער סימפטאמען ווערן אנגערופן צוריקצואונג.

צוריקצואונג סימפטאמען נעמט אריין:

- איבלונג
- ברעכן
- דייעריע (לויזע, וואסעריגע סטאל)
- קראמפיגע אבדאמינאלע (בויך) וויי
- א שנעלער הארץ ראטע
- שוויצן
- שפירן אומרואיג
- מוסקל ווייטאגן
- פיבער
- טשילס

אפיאוידיס קען גורם זיין טאלארענץ און אנגעוואנדנהייט אפילו אויב איר נעמט זיי אין די ריכטיגע וועג. אפיאוידיס צוריקציאונג איז אומבאקוועם, אבער נישט שעדליך. אונז וועלן דיר העלפן נידערן אייער דאזע אדער אויפצוהערן נעמען אפיאוידיס אויף א וועג וואס נידערט אייער מעגליכקייטן פון צוריקציאונג.

## אפיאוידיס אומריכטיגע באנוץ און אדיקשאן

אומריכטיגע באנוץ איז נעמען א מעדעצין אויף א אנדערן וועג ווי אייער העלטקעיר פראוויידער פארשרייבט. ביישפילן פון אומריכטיגע באנוץ זענען:

- נעמען א העכערע אדער נידריגע דאזע ווי אייער העלטקעיר פראוויידער פארשרייבט.
- נעמען א ווייטאג מעדעצין פאר אנדערע סיבות ווי ווייטאג.

**אדיקשאן** איז א שטארקע ציאונג צו נעמען א מעדעצין. עס קען פילן ווי איר פארלירט קאנטראל פון ויפיל מעדעצין איר נעמט אדער ווי אפט איר נעמט עס קען דיר מאכן גלוסטן די מעדעצין אדער א גאנצע צייט טראכן איבער עס נעמען. אויך קען עס דיר מאכן נעמען מעדעצין אפילו אויב עס שעדיגט אייער געזונט אדער אנדערע טיילן אין אייער לעבן.

אפיאוידיס קענען זיין אדיקטיוו אויב איר נוצט עס אויף א אנדערן וועג ווי אייער העלטקעיר פראוויידער פארשרייבט. מיר נעמען שריט צו מאכן זיכער מיר פרעסקרייבן אפיאוידיס אויף א פארזיכערטן אופן. מיר האלטן די ריזיקע פון אומריכטיגע באנוץ אדער אדיקשאן ווי נידעריג מעגליך.

## וואס צו טון ווען נעמען אפיאוידיס

- פאלג אונזער אנווייזונגען פאר נעמען אייער מעדעצין.
- איר זאלט נישט טוישן אייער אפיאוידיס דאזע אדער פלאן אן רעדן מיט א PACT פראוויידער.
- איר זאלט נאר באקומען אייער אפיאוידיס פון PACT זאג אונז אויב נאך א העלטקעיר פראוויידער פארשרייבט אפיאוידיס פאר אייך, אזוי ווי אין א עמערדזשענסי.
- לייגט אוועק אייער אפיאודס אויף א פארזיכערטן אופן. דאס בעסטע איז צו זיי אוועקלייגן אין א סעיף אדער א פארשלאסענע באקס.
- איר זאלט נישט טרינקן אלקאהאל אדער נוצן רעקריעישאנעל דראגס.

- דרייווט נישט.
- טוט נישט קיין אקטיוויטעטן וואס קען דיר שעדיגן אויב איר זענט נישט אויפמערקזאם.
- זאג אונז ווייניגסטענס 24 שעה (וטאג) פאראויס אויב איר דארפט טוישן א אפוינטמענט.
- פאלג אונזער אנווייזונגען פאר נאך א מאל אנפילן אייער מעדעצינען.

## וואס צו ערווארטן אין א PACT קליניק.

איר מוזט האבן א פערזענליכע באזוך אויב איר זענט ניי אין PACT קליניק. איר מוזט אויך אריינקומען אויב אייער לעצטע באזוך איז געווען מער ווי 1 יאר צוריק. איין מאל מיר פרעסקרייבן אפיאוידס, מוזט איר האבן א פערזענליכע באזוך יעדער 3 חודשים.

מיר וועלן דיר איבערקוקן פאר אומריכטיגע סובסטאנץ באנוץ ריזיקעס בעפאר מיר פרעסקרייבן אפיאוידס. מיר טוען אייך נאכאמאל איבערקוקן בשעת איר נעמט אפיאוידס צו פארזיכערן אז איר בלייבט פארזיכערט. דער איבערקוקן קיין אריינעמען אדער מער פון די זאכן:

- פראגעס וועגן אומריכטיגע סובסטאנץ באנוץ אדער אדיקשאן פאר אייך אדער אייער פאמיליע.
- פראגעס וועגן גייסטישע געזונטהייט צושטאנדן. עטליכע קענען העכערן אייער ריזיקע פון א סובסטאנץ באנוץ דיסארדער.

• יורין טעסט

• פיל ציילונג.

מיר קענען אויסוועלן אויפצוהערן פרעסקרייבן א מעדעצין. מיר וועלן מאכן די באשלוס געוואנדן אויף אייער אומשטענדן. מיר וועלן אויך באשטימען וויאזוי נעמען דאס מעדעצין העלפט אדער שעדיגט אייער געזונט.

## פארלאנגען א פרעשקריפשאן ריפיל.

- זאג אונז כאטש 1 טעג פאר איר לויפט אויס פון אייער מעדעצין. איר קענט אונז רופן אדער שיקן א מעסעדזש אויף MSK MyChart (MSK's פאציענט פארטאל).
- מיר קענען נישט ריפילן פרעסקריפשאן ביינאכט (צווישן 5 p.m. און 8 a.m.).
- די צאל פון מעדעצין אין יעדער ריפיל וועט זיין באזירט אויף אייער באדערפעניש און אייער פארזיכערהייט.
- אויב איר פארלירט אייער אפיאוידס, וועלן מיר ריפילן אייער פרעסקריפשאן נאר 1 מאל.
- אויב אייער אפיאוידס ווערן געגנבעט, רופט די פאליציי. שיקט אונז א קאפיע פון די פאליציי'ס באריכט. מיר קענען נישט פרעסקרייבן נאך אפיאוידס ביז מיר זעען די באריכט.

## PACT קאנטאקט אינפארמאציע

מאנטאג ביז פרייטאג, 8 a.m. ביז 5 p.m. . רופט 212-639-5607 אדער שיקט אונז א מעסעדזש אויף  
MSK MyChart אלע אנדערע צייטן, פארבינדט זיך מיט אייער MSK פריימערי קעיר טיעם. אויב איר  
זענט נישט זיכער וויאזוי זיך צו פארבינדן מיט זיי, רופט 212-639-2000.

אין א עמערדזשענסי, רופט 911 אדער גייט צו אייער לאקאלע עמערדזשענסי רום.

פאר מער ריסאורסעס, באזוכט [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) צו דורכקוקן אונזער ווירטואלע לייברערי.

---

Pediatric Advanced Care Team (PACT) Guide for Taking Opioids - Last updated on October 9, 2025  
אלע רעכטן ווערן געאייגנט און רעזערווירט דורך מעמאריעל סלאון קעטערינג קענסער צענטער

**לעצט אַפּדעיטעד**

**אָקטאָבער 9, 2025**

.Learn about our [Health Information Policy](#)

# זאָגט אונדז וואָס איר טראַכט

# זאָגט אונדז וואָס איר טראַכט

Your feedback will help us improve the educational information we provide זאָרג מאַנשאַפֿט קען נישט זען גאַרנישט וואָס איר שרייבט אויף דעם פֿידבעק פֿאַרעם. ביטע ניצט עס נישט צו פרעגן וועגן אייער זאָרג. אויב איר האָט פֿראַגעס וועגן אייער זאָרג, קאָנטאַקט אייער געזונטהייטס פֿאַרזאָרגער.

כאָטש מיר לייענען אַלע פֿידבעק, קענען מיר נישט ענטפֿערן קיין פֿראַגעס. ביטע שרייבט נישט אייער נאמען אדער קיין פערזענלעכע אינפארמאציע אויף דעם פידבעק פארעם.

איז די אינפֿאַרמאַציע געווען גרינג צו פֿאַרשטיין?

יא

עטוואָס

No ניין

איז די אינפֿאַרמאַציע געווען גרינג צו פֿאַרשטיין?

ביטע שרייבט נישט אייער נאמען אדער סיי וועלכע פערזענליכע אינפארמאציע.

איינגעבן



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center