



患者与护理者教育

有关您的Xofigo[®]治疗

这份信息将帮助您做好在史隆-凯特琳癌症纪念医院（Memorial Sloan Kettering, MSK）进行Xofigo治疗的准备工作。

有关Xofigo

Xofigo是一种药物，用来治疗已经扩散到您的骨骼的前列腺癌。它可以帮助预防由您骨骼中的癌症引起的症状。

Xofigo是一种放射性靶向治疗。这意味着它有2个主要部分：放射性部分和肿瘤靶向部分。

- 肿瘤靶向部分帮助该药仅对抗肿瘤细胞，不伤害您的正常细胞。这有助于避免该药损害您身体的健康部位。
- 放射性部分使用辐射（能量波）来破坏和杀灭肿瘤细胞。

Xofigo采用静脉（IV）注射。静脉（IV）注射是将药物通过静脉导管输入您的静脉。

计划您的Xofigo治疗

在您接受Xofigo之前，您将约见分子成像和治疗服务（Molecular Imaging and Therapy Service, MITS）的医生。有时候称之为核医学（Nuclear Medicine）服务。您可能需要在您的约见之前进行一次血液测试。如果您确实要做该测试，MITS工作人员将给您更多信息。

在您约见期间，您的MITS医生将询问您的病史，并就Xofigo治疗的目的与您交谈。您的医生将使用您的病史和血液测试的结果来了解Xofigo是否适合您。

如果您和您的MITS医生决定您将进行Xofigo治疗，您的MITS医生或护士将与您检视副作用，并且让您知道预计会发生什么情况。他们还将给您有关您的Xofigo治疗日程安排。

如果您正在接受针对前列腺癌的其他治疗（比如化疗、放疗或其他类型的放射性靶向治疗），您可能需要在您的Xofigo治疗之前和期间停止该治疗。如果需要停止，您的医生将告诉您更多信息。

Xofigo治疗日程安排

Xofigo分6次单独的注射给予。前后两次注射之间间隔4周。您的最后一次Xofigo注射将在您的第一次注射后20周（约4个半月）时进行。您要来MSK进行每次注射。

您还将在每次注射前2至3天进行一次血液测试。您可以在离您最近的MSK场所进行这些血液测试。

下面这个时间轴列出了您的Xofigo治疗日程安排。




图1. Xofigo治疗日程安排

有关您按约赴诊注射Xofigo

地点

您按约赴诊注射Xofigo将在MITS治疗室进行。

前往MITS治疗室，请从第一大道1250号（在第67街和第68街之间）（1250 First Avenue [between 67th Street and 68th Street]）大门进入医院。到大厅中的保安台（security desk）向左转，从楼梯上到4层，然后在接待处登记。工作人员将带您到MITS治疗室。

如果您想搭乘电梯而不走楼梯，或者如果您不确定去哪里，您可以向保安寻求帮助。

预计会发生什么情况

在MITS治疗室，您将坐在有电视和WiFi的私人房间里。护士将在您的一条静脉中置入静脉导管。然后，医生将把Xofigo注射到静脉导管中。医生将缓慢注射，用时约1分钟。在完成注射后，护士将取下静脉导管。

在Xofigo注射后，您可能会出现：

- 恶心（想要呕吐的感觉）
- 腹泻（松散或水样便）
- 脚踝或手腕肿胀

在您注射后的最初几天里，可能会出现这些情况。您的MITS医生或护士将给您提供更多信息。

放疗安全性防范措施

在您的Xofigo注射之后，您的血液、尿液（小便）和粪便（大便）中会带有辐射。在您完成赴诊注射要离去之前，放疗安全专员（专职放疗安全性的工作人员）将就有关您的放疗安全性防范措施与您交谈。他还将给您书面指示让您在家里遵守。

遵守下述放疗安全性防范措施，以及放疗安全专员给您的指示，以避免让其他人暴露于辐射中。

在每次Xofigo注射后1周内：

- 您上完厕所后，马桶冲水，用肥皂和水清洗您的双手。
- 如果您有任何床上用品或衣物被尿液、血液或粪便弄脏，把它们与其他衣物分开洗涤，并彻底冲洗干净。
- 当擦洗血液、尿液、粪便、呕吐物、或者当处理弄脏的衣物时，戴上医用手套。

在接受Xofigo注射后与其他人接触方面没有限制。

有些类型的安保设备（比如在机场或隧道出口）能检测出非常少量的辐射。工作人员将发一张卡片给您，上面注明您接受了放射性药物，且您可能在治疗后最长达1个月发出少量辐射。如果您在检查点被执法机构拦截，向他们出示该卡。

如果您有关于放疗安全性的任何问题，请于周一至周五，上午9点至下午5点致电
212-639-7391。

在您按约赴诊注射Xofigo后

遵守放疗安全性干事发给您的放疗安全性指示。

在每次注射后饮用大量液体。这将帮助来自Xofigo的辐射更快地离开您的身体。尤为重要
的是，在厕所要遵守放疗安全性指示，以清除或用水冲掉您的体液（比如尿
液）。

在您的Xofigo治疗期间（从您第一次注射直至您最后一次注射后6个月）：

- 在性行为期间必须使用避孕套。
- 不要让您的伴侣怀孕。
- 不要让您的伴侣暴露于（接触到）您的精液。



如果您有问题，与您的MITS医生或护士交谈。

联系方式

如果您有任何问题或顾虑，请致电分子成像和治疗服务（Molecular Imaging and
Therapy Service）。

- 周一至周五，上午9点至下午5点，致电212-639-3146。要求与分子成像和治疗
服务（Molecular Imaging and Therapy Service）护士通话。
- 下午5点以后、周末和节假日期间，致电212-639-2000。要求与分子成像和治
疗服务（Molecular Imaging and Therapy Service）的值班人员通话。

更多资源，请访问www.mskcc.org/pe以搜寻我们的虚拟图书馆。

有关您的Xofigo®治疗 - Generated on July 19, 2019

©2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center