



患者与照护者资讯

含有阿司匹林和其他非类固醇类抗炎药的常用药物

这份资料将帮助您认识含有阿司匹林和其他非类固醇类抗炎药（NSAID）的药物。重要的是，在许多癌症治疗之前，都要停止使用这些药物。

阿司匹林、其他非类固醇类抗炎药（NSAID）（比如布洛芬[ibuprofen]）和维生素E可增加您在癌症治疗期间的流血风险。这些药物会影响您的血小板（血小板是能够凝结的血细胞，从而防止流血）。阅读章节“示例药物”来查看您的药物是否含有阿司匹林、其他非类固醇类抗炎药（NSAID）或维生素E。

如果您使用阿司匹林、含有阿司匹林、其他非类固醇类抗炎药（NSAID）或维生素E的药物，请告诉您的医疗保健提供者。他们将告诉您，您是否需要在治疗之前停止使用这些药物。您还将在有关您的治疗的信息中找到相关的指示。

在您的手术之前

如果您要做手术，遵守以下指示。如果您的医疗保健提供者给您其他的指示，则改为遵守那些指示。

- 在您的手术10天前，停止使用含有维生素E的药物，或者按照您的医疗保健提供者的指示。
- 在您的手术之7天前，停止使用含有阿司匹林的药物，或者按照您的医疗保健提供者的指示。如果您因出现过心脏问题或因得过中风而使用阿司匹林，在您停止使用该药之前与您的医疗保健提供者交谈。
- 在您的手术之48小时（2天）前，停止使用非类固醇类抗炎药（NSAID），或者按照您的医疗保健提供者的指示。

在您的放射科手术程序之前

如果您要进行放射科手术程序（包括介入放射、介入性乳腺X线摄影、乳腺成像和普通放射），遵守以下指示。如果您的医疗保健提供者给您其他指示，则改为遵守那些指示。

- 在您的手术程序10天前，停止使用含有维生素E的药物，或者按照您的医疗保健提供者的指示。
- 如果您的医疗保健提供者让您停止使用阿司匹林，在您的手术程序5天前停用它，或者按照您的医疗保健提供者的指示。如果您因出现过心脏问题或因得过中风而使用阿司匹林，在您停止使用该药之前与您的医疗保健提供者谈谈。
- 在您的手术程序24小时（1天）前，停止使用非类固醇类抗炎药（NSAID），或者按照您的医疗保健提供者的指示。

在您化疗之前和化疗期间

化疗会降低您的血小板计数，这会增加您的流血风险。无论您是刚开始化疗还是已经做了一段时间，在使用阿司匹林或非类固醇类抗炎药（NSAID）之前，都要先征询您的医疗保健提供者。

示例药物

药物通常以它们的品牌名称来称谓，这可能会使人难以知道它们的成份。为了帮助您认识含有阿司匹林、其他非类固醇类抗炎药（NSAID）和维生素E的药物，请阅读以下清单。

这些清单包括最常用的药品，但不止这些。如果您不确定，向您的医疗保健提供者征询。始终要确保您的医疗保健提供者知道您正在使用的所有药物，包括处方药和非处方药。

含有阿司匹林的常用药物

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Aggrenox® | Cama® 关节炎止痛药 | Heartline® | Robaxisal® 片剂 |
| Alka Seltzer® | COPE® | Headrin® | Roxiprin® |
| Anacin® | Dasin® | Isollyl® | Saleto® |
| 关节炎止痛配方 | Easprin® | Lanorinal® | Salocol® |
| Arthritis Foundation Pain Reliever® (关节炎基金会止痛药) | Ecotrin® (大多数剂型) | Lortab® ASA片剂 | Sodol® |
| ASA Enseals® | Empirin® 阿司匹林 (大多数剂型) | Magnaprin® | Soma® 复方片剂 |
| ASA Suppositories® | Epromate® | Marnal® | Soma® 复方可待因片剂 |
| Ascriptin® 和 Ascriptin A/D® | 止痛 (Equagesic) 片剂 | Micrainin® | St. Joseph® 阿司匹林成人咀嚼片 |
| Aspergum® | Equazine® | Momentum® | Supac® |
| Asprimox® | Excedrin® 特效止痛片和囊片 | Norgesic Forte® (大多数剂型) | Synalgos® -DC胶囊 |
| Axotal® | Excedrin®, 治疗偏头疼 | Norwich® 阿司匹林 | Tenol-Plus® |
| Azdone® | Fiorgen® | PAC® 止痛片 | Trigesic® |
| Bayer® (大多数剂型) | Fiorinal® (大多数剂型) | Orphengesic® | Talwin® 复方制剂 |
| BC® 粉剂和治感冒剂型 | Fiortal® | Painaid® | Vanquish® 止痛囊片 |
| Bufferin® (大多数剂型) | Gelpirin® | Panasal® | Wesprin® 缓冲剂 |
| Buffets II® | Genprin® | Percodan® 片剂 | Zee-Seltzer® |
| Buffex® | Gensan® | Persistin® | ZORprin® |

属于非类固醇类抗炎药（NSAID）但不含阿司匹林的常用药物

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Advil® | Duexis® | 甲灭酸 (Mefenamic Acid) | PediaCare Fever® |
| Advil Migraine® | Etodolac® | 美洛昔康 (Meloxicam) | 吡罗昔康 (Piroxicam) |
| Aleve® | Feldene® | Menadol® | Ponstel® |
| Anaprox DS® | 非诺洛芬 (Fenoprofen) | Midol® | Relafen® |
| Ansaid® | 氟比洛芬 (Flurbiprofen) | Mobic® | Saleto 200® |
| Arthrotec® | Genpril® | Motrin® | 舒林酸 (Sulindac) |
| Bayer® 特选止痛药配方囊片 | 布洛芬 (Ibuprofen) | 萘丁美酮 (Nabumetone) | Toradol® |
| Celebrex® | 吲哚美辛 (Indomethacin) | Nalfon® | Treximet® |
| 塞来昔布 (Celecoxib) | Indocin® | 萘普生 (Naproxen) | Vicoprofen® |
| Children's Motrin® | 酮洛芬 (Ketoprofen) | Naprosyn® | Vimovo® |
| Clinoril® | 酮咯酸 (Ketorolac) | Nuprin® | Voltaren® |
| Daypro® | Lodine® | Orudis® | |
| 双氯灭痛 (Diclofenac) | 甲氯芬那酸盐 (Meclofenamate) | 奥沙普秦 (Oxaprozin) | |

含有维生素E的药品

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Amino-Opt-E | Aquavit | E-400 IU | E complex-600 |
| Aquasol E | D'alpha E | E-1000 IU Softgels (软胶囊) | Vita-Plus E |

大多数多种维生素都含有维生素E。如果您使用多种维生素，请查看标签。

有关对乙酰氨基酚 (Acetaminophen)

在您的癌症治疗期间使用对乙酰氨基酚（泰诺）[acetaminophen (Tylenol®)]一般是安全的。它不影响血小板，所以它不会增加您流血的风险。不过，如果您要接受化疗，在使用对乙酰氨基酚（acetaminophen）之前先征询您的医疗保健提供者。

含有对乙酰氨基酚（Acetaminophen）的药物

| | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------|
| Acephen® | Esgic® | Percocet® | Vanquish® |
| 含可待因的Aceta® | Excedrin P.M.® | Primlev® | Vicodin® |
| 含可待因的对乙酰氨基酚 | Fiorcet® | Repan® | Wygesic® |
| Aspirin-Free Anacin® (不含阿司匹林的 Anacin®) | Lorcet® | Roxicet® | Xartemis XR® |
| Arthritis Pain Formula® Aspirin- Free (不含阿司匹林的 关节炎止痛配方) | Lortab® | Talacen® | Xodol® |
| Datril® | Naldegesic® | Tempra® | Zydone® |
| Di-Gesic® | Norco® | Tylenol® | |
| Endocet® | Panadol® | Tylenol® 含3号可待因 | |

阅读您所有药物的标签

当按照指示使用时，对乙酰氨基酚（acetaminophen）是安全的。不过，您1天中能摄入的量是有限制的。有可能会在不知情的情况下摄入太多的对乙酰氨基酚（acetaminophen），因为许多不同的药物中都含有它。

始终阅读和遵守您正在使用的药品上的标签。对乙酰氨基酚（acetaminophen）是非处方药和处方药中一种非常常见的成份。它通常是止痛药、退烧药、安眠药、以及止咳药、感冒药和过敏药物的成份。

对乙酰氨基酚（acetaminophen）的全名并不总是写出来的。查看以下常用缩写，尤其是在处方止痛药里的缩写。

对乙酰氨基酚（Acetaminophen）的常用缩写

| | | |
|----------|--------|-------------|
| APAP | AC | Acetaminop |
| Acetamin | Acetam | Acetaminoph |

未经向您的医疗保健团队的成员征询，请勿一次使用超过1种含有对乙酰氨基酚（acetaminophen）的药物。

如果您有任何问题，直接联系您的医疗保健团队的成员。如果您是MSK的患者并且您需要在下午5点后、周末或节假日期间联系医务人员，请致电212-639-2000。

如想获得更多信息，请访问www.mskcc.org/pe 以搜寻我们的虚拟图书馆。

含有阿司匹林和其他非类固醇类抗炎药的常用药物 - Last updated on April 15, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center