门诊细胞治疗急诊指南

操作指南：

重大紧急情况（危及生命）：

1. **拨打 911。**在没有紧急医疗服务 (EMS) 支持的情况下，请勿转运患者。
2. EMS 可能会立即将您送往最近的医院接受救治。**这是合理**且预期会发生的情况——您的安全是第一位的，我们的团队会根据需要与该医院协调治疗事宜。

轻微紧急情况（无生命危险）：

1. 将患者送至 MSK 的紧急护理中心 (UCC)。
2. 到达时，请告诉 UCC 工作人员该名患者为细胞疗法患者。

MSK 紧急护理中心 (UCC) 地址：

- 早上 6 点到午夜之间，请从东 67 大街 425 号入口进入（位于第一大道和约克大道之间）。
- 所有其他时间，请从约克大道 1275 号入口进入（东 67 大街和东 68 大街之间）。请向安保服务台问路。

非紧急情况：	如果出现以下情况，请拨打细胞治疗中心电话 646-608-3150（全天候服务）。
细胞治疗肿瘤科医生	
细胞治疗输注日期：	

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

	重大紧急情况： 请拨打 911	**轻微紧急情况：** 请前往 MSK 的 UCC	**非紧急情况：** 请致电细胞疗法部门，电话：646-608-3150
警觉性	• 无法醒来 • 手脚突然无法动弹 • 癫痫发作（出现无法控制的颤抖或僵硬）	• 视力发生突然改变	• 头晕 • 颤抖或摇晃 • 情绪变化 • 精力水平变化 • 无法入睡 • 新发意识模糊，或意识模糊比平时加剧 • 难以找到合适的单词 • 警觉水平变化 • 麻木或刺痛 • 无法四处走动 • 吞咽困难
出血		• 无法止住的出血	• 呕（吐）血 • 无法止住的流鼻血 • 尿血 • 粪便为黑便和柏油便 • 每小时使用 1 块或更多护垫 • 瘀斑（皮肤上出现红色或紫色的小斑点） • 新发出血或出血量比平时更多
血糖		• 血糖值低于 50 • 血糖值高于 400 • 难以醒来	• 血糖值介于 50 和 400 之间
呼吸	• 没有呼吸 • 呼吸困难 • 窒息		• 喘息（呼吸时发出哨声或吱吱声） • 极少量活动就更容易喘不过气（呼吸短促） • 新发咳嗽或持续咳嗽 • 咳血、绿色或黄色粘液 • 躺下时呼吸困难
中央静脉导管（CVC）		• 导管通气，呼吸短促。**立即夹紧导管。** • 导管破损或泄漏 • 导管脱落	• 无法冲洗导管 • 插入部位有溢液 • 插入部位疼痛 • 插入部位肿胀、发红或压痛 • 面部或颈部肿胀
腹泻（稀便或水样便）		• 腹泻持续且不受控制	• 开始腹泻和腹部绞痛 • 整粒药丸随大便排出
跌倒	• 跌倒后意识变化	• 跌倒时撞伤头部	• 跌倒时未撞到头部 • 在家跌倒 • 跌倒后意识无变化
疲乏（感觉比平时更疲倦或更虚弱）	• 无法醒来		• 头晕 • 过于疲劳，以至于无法下床或去上厕所

	重大紧急情况： 请拨打 911	**轻微紧急情况：** 请前往 MSK 的 UCC	**非紧急情况：** 请致电细胞疗法部门，电话：646-608-3150
发热或寒战		• 经口测量体温时，发热 ≥100.4 °F (38 °C) • 颤抖性寒战（体温可能正常）	• 感冒症状（流鼻涕、流眼泪、打喷嚏、咳嗽）
口腔疼痛 （粘膜炎）	• 没有呼吸 • 呼吸困难		• 口腔内有鲜红色血液 • 吞咽困难 • 牙龈、嘴唇或口腔内部出现白斑或溃疡 • 使用止痛药后疼痛没有缓解
恶心或呕吐 （感觉想呕吐）		• 剧烈胃痛 • 呕吐物中带血或“咖啡渣”物质 • 无法控制的持续恶心和呕吐	• 服药后呕吐 • 服用抗恶心药物后恶心症状仍未停止
疼痛	• 剧烈胸痛 • 胸部有严重挤压或压力感	• 突发性剧烈头痛	• 新发或无法控制的疼痛 • 心脏狂跳 • 心脏砰砰跳 • 胸部或胃部灼痛 • 排尿或排便时出现疼痛或烧灼感 • 中央静脉导管 (CVC) 插入部位疼痛 • 通过 CVC 注射药物或液体时出现疼痛
皮疹			• 新发皮疹 • 皮疹，伴有疼痛、瘙痒或两者兼有
肿胀	• 呼吸困难	• 喉咙肿胀	• 腿部、手臂或手部肿胀 • 突发性肿胀，可能伴有疼痛
排尿			• 尿血 • 排尿时疼痛或灼热 • 超过 8 小时无法排尿