



患者及照护者教育

# 关于您的消融手术

本资源说明了您在 MSK 的消融手术、预期情况以及如何做好准备。

## 什么是消融？

消融是一种能够杀死癌细胞的微创手术。通过皮肤上的小切口或针头完成微创手术。您的消融手术将由一名介入放射科 (IR) 医生完成。介入放射科医生（也称为 IR 医生）是专门从事影像引导下手术的医生。

消融手术有不同的类型，分别以不同的方式杀死癌细胞。医疗保健提供者将与您交流，告知您哪种类型最适合您。

在消融手术前，将对您进行麻醉（使用药物使您入睡）。

在消融手术过程中，IR 医生会将一种特殊的针插入您的皮肤。非常热或非常冷的温度通过针头杀死癌细胞。

IR 医生将使用 7 图像引导针头进入肿瘤。成像可能包括：

- X 线透视（实时 X 线）
- 计算机断层扫描 (CT)。
- 磁共振成像 (MRI) 扫描。

- 超声。

您的医疗保健提供者将决定您当天出院是否安全。若要当天出院，请务必确保有一名负责任的照护者接您回家。请阅读本资源“安排人接您回家”部分，以了解更多信息。

许多患者消融后在医院过夜。请与您的医疗保健提供者讨论可能发生的情况。他们会根据需要进行帮助您制定计划。

## 消融前应完成的事项

### 成像检查

您的医疗保健提供者将使用既往 CT、MRI 或超声图像来决定您是否需要消融。IR 医生将使用这些图像来计划将针插入肿瘤的位置。

### 询问用药情况

您可能需要在手术前停用某些常用药物。您需要与您的医疗保健提供者讨论停用哪些药物对您是安全的。

我们在下面列举了一些常见的例子，但还有其他类型。确保您的医疗团队了解您服用的所有处方药和非处方药。处方药是指只能凭医疗保健提供者开具处方才可获得的药物。非处方药是指无需开具处方即可购买的药物。



在手术前几天内正确服药非常重要。如果没有这样做，我们可能需要重新安排您的手术。

### 抗凝剂（血液稀释剂）

血液稀释剂是一种能改变血液凝结方式的药物。血液稀释剂通常

用于预防心脏病发作、中风或由血栓引起的其他问题。

如果您服用血液稀释剂，请向医疗保健提供者咨询医疗程序前应该如何处理。他们可能会告诉您在医疗程序前的特定天数停止服用。这将取决于您所要接受的医疗程序类型和您使用血液稀释剂的原因。

血液稀释剂示例如下：还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。请勿在未咨询您的医疗团队成员的情况下停用您的血液稀释剂药物。

<ul style="list-style-type: none"><li>● 阿哌沙班 (艾乐妥®)</li><li>● 阿司匹林</li><li>● 塞来昔布 (西乐葆®)</li><li>● 西洛他唑 (Pletal®)</li><li>● 氯吡格雷 (波立维®)</li><li>● 达比加群 (泰毕全®)</li><li>● 达肝素 (法安明®)</li><li>● 双嘧达莫 (潘生丁®)</li><li>● 依度沙班 (Savaysa®)</li><li>● 依诺肝素 (Lovenox®)</li><li>● 磺达肝癸钠 (Arixtra®)</li><li>● 肝素注射 (针剂)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 美洛昔康 (莫比可®)</li><li>● 非甾体抗炎药 (NSAID)，如布洛芬 (Advil®, Motrin®) 和萘普生 (Aleve®)</li><li>● 己酮可可碱 (巡能泰®)</li><li>● 普拉格雷 (Effient®)</li><li>● 利伐沙班 (拜瑞妥®)</li><li>● 柳氮磺胺吡啶 (Azulfidine®, Sulfazine®)</li><li>● 替格瑞洛 (倍林达®)</li><li>● 亭扎肝素 (Innohep®)</li><li>● 华法林 (Jantoven®, Coumadin®)</li></ul>
---	--

其他药物和补充剂会改变血液凝固的方式。示例包括维生素 E、鱼油和非甾体抗炎药 (NSAID)。请阅读 *如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油*

([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-)

[education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](#))。其中的内容可以帮助您了解医疗程序前可能需要避免服用哪些药物和补充剂。

## 糖尿病药物

如果您服用胰岛素或其他糖尿病药物，请与您的 MSK 医疗保健提供者和开具处方的医疗保健提供者沟通。询问手术或医疗程序前应该做什么。您可能需要停止服用这类药物，或服用与平时不同的剂量。在手术或医疗程序前，您可能还需要遵循不同的饮食指示。请遵循医疗保健提供者的指导说明。

您的医疗团队会在手术或医疗程序期间检查您的血糖水平。

## GLP-1 减肥药

如果您服用 GLP-1 药物，请务必告知您的医疗保健提供者。在手术或医疗程序前，您将需要遵循特殊的饮食指示。遵循这些指导说明非常重要。如果没有遵循指导说明，您的手术或医疗程序可能会被推迟或取消。

- 在手术或医疗程序前一天，请遵循清流质饮食。请勿食用固体食物。如需了解更多信息，请阅读[清流质饮食 \(www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet\)](#)。
- 抵达时间前 8 小时停止饮用。之后请勿摄入任何东西，包括清流质。您可以喝几小口水送服药物。

如需了解更多信息，请阅读[服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序](#)

前的饮食须知 ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines))。

以下是一些 GLP-1 药物示例。还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。有时，开具这些药物用于帮助控制糖尿病或其他疾病。有时，也会用于减肥。

<ul style="list-style-type: none"><li>● 塞马格鲁肽 (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)</li><li>● 度拉糖肽 (Trulicity®)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 替西帕肽 (Zepbound®, Mounjaro®)</li><li>● 利拉鲁肽 (Saxenda®, Victoza®)</li></ul>
--	---

## 利尿剂（水丸）

利尿剂是一种有助于控制体内液体积聚的药物。利尿剂通常用于治疗高血压或水肿。还可用于治疗某些特定心脏或肾脏问题。

如果您正在服用任何利尿剂，请在手术前咨询负责为您做手术的医疗保健提供者应如何处理。您可能需要在手术当天停用该药物。

我们在下面列举了一些常见的利尿剂示例。还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。

<ul style="list-style-type: none"><li>● 布美他尼 (Bumex®)</li><li>● 呋塞米 (Lasix®)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 氢氯噻嗪 (Microzide®)</li><li>● 螺内酯 (Aldactone®)</li></ul>
--	--

## 取下皮肤上的医疗设备

您可能在皮肤上佩戴了某些医疗设备。在进行医疗程序、手术或扫描之前，某些医疗设备制造商会建议您取下：

- 连续血糖监测仪 (CGM)
- 胰岛素泵

您可以与您的医疗保健提供者讨论将您的预约安排在更接近您需要更换这些设备的日期。确保携带一个额外设备，以便在医疗程序、手术或扫描后佩戴。

您可能不确定如何在不佩戴设备时管理您的血糖。如果不确定，请在预约前询问治疗您糖尿病的医疗保健服务提供者。

### **安排人接您回家**

疗程后请务必确保有一名负责任的照护者接您回家。负责任的照护者必须能够帮助您安全回到家中。如果他们有任何问题，应能够联系您的医疗团队。请务必在活检开始前将此事安排好。

如果没有负责任的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或使用汽车服务，但必须保证有一个负责任的照护者陪同。

#### **纽约地区服务机构**

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

#### **新泽西地区服务机构**

Caring People: 877-227-4649

### **如果您有任何生病不适请告知我们**

如果您在手术前出现任何不适（包括发烧、感冒、喉咙痛或流感），请致电您的 IR 医生。您可以在周一至周五上午 9:00 至下午

5:00 致电联系。

下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000。联系值班的介入放射科医生。

## 请记住您的预约时间

工作人员会在手术前 2 个工作日给您打电话。如果您的手术安排在周一，他们会在前一个周四致电您。他们将告知您应该于何时到达医院接受活检。他们还会提醒您抵达的地点。

如果您在活检前的工作日中午（中午 12 点）前仍未接到我们的来电，请致电 646-677-7001。如果您因任何原因需要取消医疗程序，请致电为您安排该医疗程序的医疗保健提供者。

## 消融前一天应完成的事项

### 进食指导说明

重要信息：如果您服用 GLP-1 药物，请勿遵循以下说明。请遵循服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序前的饮食须知 ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)) 中的说明。



手术或医疗程序前的午夜（凌晨 12 点）后请停止进食。其中包括硬糖和口香糖。

您的医疗保健提供者可能会就何时停止进食给出不同

的指示。如被告知，请遵循其指示。有些人需要在手术或医疗程序前禁食（不吃东西）更长时间。

## 消融当天应完成的事项

### 液体摄入指导说明

重要信息：如果您服用 GLP-1 药物，请勿遵循以下说明。请遵循服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序前的饮食须知 ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines))中的说明。

午夜（凌晨 12 点）至抵达时间前 2 小时，只能饮用以下所列的液体。请勿进食或饮用其他任何饮品。抵达时间前 2 小时停止饮用。

- 水。
- 透明的苹果汁、葡萄汁或蔓越莓汁。
- Gatorade 或 Powerade。
- 黑咖啡或清茶。可以添加糖。请勿添加任何其他东西。
  - 请勿添加任何含量任何类型的牛奶或奶精。包括植物奶和奶精。
  - 请勿添加风味糖浆。

如果您患有糖尿病，请注意这类饮料中的含糖量。如果摄入这类

饮料的无糖、低糖或无添加糖版本，会更容易控制血糖水平。

在手术和医疗程序前保持水分会有所帮助，因此如果口渴请饮用液体。请勿摄入超出所需的饮水量。手术或医疗程序期间，您将接受静脉 (IV) 输液。



抵达时间前 2 小时停止饮用。其中包括水。

您的医疗保健提供者可能会就何时停止饮水给出不同的指示。如被告知，请遵循其指示。

## 注意事项

- 请仅服用您的医生告知您在手术当天早晨可服用的药物。请喝几口水送服。
- 请勿涂抹身体乳膏、乳液或凡士林 (Vaseline®)。您可以使用除臭剂和面部保湿剂。
- 请不要化眼妆。
- 穿着宽松舒适的衣服。
- 请取下所有的首饰，包括身体穿孔饰品。
- 请将不需要使用的贵重物品留在家中。
- 如果您习惯配戴隐形眼镜，如果可能，请换成镜框眼镜。如果您没有镜框眼镜，请携带您的隐形眼镜盒

## 随身携带的物品

- 治疗呼吸问题的药物（如有）。包括吸入器和治疗胸痛的药

物。

- 如果您佩戴连续血糖监测仪 (CGM)，请携带一个额外的备用。
- 镜框眼镜或隐形眼镜盒（如果您平时戴眼镜）。
- 义齿胶（如果您佩戴义齿）。您的医疗保健代表委托书（如果您已完成）。
- CPAP 或 BiPAP 机（如您使用的话）。如果您无法随身携带这些设备，我们将在您住院期间为您提供。

## 抵达医院后的预期情况

许多工作人员会要求您说出并拼写出您的姓名和出生日期。这是为了保障您的安全。姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受扫描。

当到您该为手术更衣时，我们会为您提供医院病号服、长袍、手术帽和防滑袜更换。请取下所有假体装置、假发、首饰和宗教物品（如有）。

## 与护士见面

您将在治疗之前与您的护士见面。请将您在午夜（凌晨 12:00）之后服用的任何药物的剂量及服用时间告知他们。请确保包括处方药、非处方药、贴片和药膏。

护士可能会在您的一根静脉中放置一根静脉注射 (IV) 导管，通常是您的手臂或手上的静脉。如果您已置入中心静脉导管 (CVC)，他们可能会使用您的 CVC。常见的 CVC 包括：

- 一个植入式输液港。

- 一个 Hickman® 导管。
- 一个经外周静脉置入中心的静脉导管 (PICC) 管路。

## 与 IR 医生会面

您将在医疗程序之前与您的 IR 医生交谈。他们会在您签署知情同意书之前，与您交谈手术相关事宜并回答您的任何问题。签署知情同意书即表明您同意该手术并理解相关风险。请与您的医疗团队确认将采用何种镇静或麻醉方式。

## 与麻醉师见面

您可能还会与麻醉师见面。麻醉师是指在麻醉方面受过专门培训的医生。如有需要，他们将在医疗程序期间给您输送麻醉药。

此外，他们还将：

- 与您一起查看您的病史。
- 询问您既往使用麻醉药是否曾出现过问题。包括恶心（感觉想吐）或疼痛。
- 和您谈论手术过程中的舒适度和安全性。
- 和您谈论您将接受哪种麻醉。
- 回答您提出的麻醉相关问题。

请与您的医疗保健提供者讨论可能发生的情况。

## 进入检查室

到了检查时间，您将取下助听器、眼镜和假牙（如果有）。您将自己走进检查室，或者躺在担架上由工作人员抬入检查室。

## 检查室内的预期情况

医疗团队成员会帮助您上手术台。工作人员会将压缩靴穿戴于您的小腿上。它们可以缓慢充气或放气，促进您腿部的血液循环。

当您感觉舒适后，护士或麻醉师会通过您的静脉注射导管为您施用麻醉药，让您入睡。在治疗过程中和治疗后，您还将通过静脉注射导管接受输液。

根据您的消融类型，可能需要在您的大腿上安装接地垫。这些接地垫是为了您的安全考虑。您的护理团队会对您的腿部安装接地垫的位置进行剃毛。这有助于更好粘贴接地垫。

您的医疗保健提供者会用抗菌剂清洁您的皮肤。这是一种用于杀灭病菌和细菌的液体。您的护理团队会在消融后清洁该位置。您的皮肤可能会在短时间内呈现橙色。一天之内就会消失。

IR 医生将为您进行局部麻醉。该药物用来麻醉将针扎进皮肤的部位。随后，IR 医生将使用实时成像扫描引导针头进入您的肿瘤。

## 消融后

手术完成之后，您将在麻醉复苏室 (PACU) 内醒来。护士会追踪记录您的体温、脉搏、血压和氧气水平。您可能会通过位于鼻子下方的一根细管，或覆盖鼻子和嘴部的面罩来获得氧气。我们还会将压缩靴穿戴于您的小腿上。

扎针的皮肤部位会覆盖一小块敷料（绷带）。您的护士将指导您如何在家中更换敷料以及自我护理。

如果您感到疼痛，请告知您的护士。他们可能会给您开药以缓解疼痛。在您离开医院前，护士将为您取出 IV 管线。

您可询问护士您在 PACU 预期停留的时间。如果您需要在医院过夜，工作人员会将您转移到普通病房。如果您当天就出院，您的医疗保健提供者将告诉您何时可以安全使用。您将需要有一名负责任的照护者接您回家。

## 安排随访检查和预约

您将接受随访影像检查和医生预约访视。这些都是为了确保消融治疗已经彻底将肿瘤消灭。如果还未给您安排随访影像学检查，请致电您的医生办公室。

## 何时致电您的医疗保健提供者

如果您在消融治疗后出现以下情况，请致电给为您做手术的 IR 医生：

- 发热达 100.4°F (38.3 °C) 或更高。
- 呼吸困难，尤其是做过肺消融术后。
- 疼痛、恶心或呕吐相较您治疗前加重。
- 扎针或放置接地垫的部位周围出现发红、肿胀或疼痛。
- 任何新发症状。
- 对手术有任何疑问或担忧。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

About Your Ablation Procedure - Last updated on February 10, 2026  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利