



患者及照护者教育

关于介入放射学手术中的麻醉

本信息介绍了您在介入放射学 (IR) 手术过程中可能接受的各种麻醉类型。

麻醉是指在手术过程中帮助您避免感到疼痛或不适的药物。并非所有患者都会接受同一种类型的麻醉。医疗团队将根据您的健康状况，为您推荐最适合该手术且对您最安全的麻醉方案。

手术前，麻醉团队将向您说明麻醉方案并解答您的疑问。

局部麻醉

局部麻醉会使您身体上将进行手术的小范围区域失去知觉。该种麻醉将通过注射的方式给药。手术过程中您将保持清醒。您可能会感受到压力或动作，但不应感到剧痛。

区域麻醉

区域麻醉会使身体较大范围的区域失去知觉。该种麻醉将通过注射的方式给药。区域麻醉既可以单独使用，也可以与其他类型的麻醉结合使用。

您可能会感受到压力或动作，但不应感到剧痛。

中度镇静

中度镇静 (MOSED) 有时也被称为轻度镇静、清醒镇静或半睡眠镇静。有助于您在手术过程中感到放松和困倦。您可能仍保持足够的清醒，可以与您的医疗团队交谈。

中度镇静由接受过特殊培训的护士在医生或高级实践提供者的指导下实施。他们在手术过程中会密切监测您的状况。许多人对自己的手术过程记忆甚少，甚至完全不记得。

监护性麻醉

监护性麻醉 (MAC) 由麻醉医疗团队的一名成员负责提供。有助于您在手术过程中感到舒适。

您可能会接受轻度或深度镇静。在轻度镇静下，您保持清醒，但会感到放松和困倦。在深度镇静下，您可能会在手术的部分过程中入睡或感到昏昏欲睡。许多人对自己的手术过程记忆甚少，甚至完全不记得。

监护性麻醉由麻醉医疗团队的一名成员负责提供。麻醉医疗团队将在整个手术过程中密切监测您的状况

全身麻醉

全身麻醉会让您在手术期间保持睡眠状态。您将无法察觉所发生的事情。您将通过静脉注射（插入静脉的一种细管）以及佩戴面罩吸入麻醉气体（或通过其他呼吸方式）来接受麻醉。

这将使您在手术期间保持睡眠状态并感到舒适。麻醉医疗团队将在整个手术过程中密切监测您的状况。

手术完成之后

医疗团队将持续监测您的状况，直到您可以安全回家为止。医疗团队会告知您预期情况。

如何选择麻醉方式

医疗团队将根据以下因素，为您选择最合适的麻醉方式：

- 您的健康状况和病史。
- 您将接受的手术类型。
- 预计手术将持续多长时间。

如果您对麻醉方案有任何疑问，请咨询您的医疗团队。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Anesthesia During Interventional Radiology Procedures -
Last updated on July 13, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利