Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

关于连续上肢神经阻滞导管

本信息介绍了连续上肢神经阻滞导管。 其中解释了该导管是什么、如何运作以及置入导管后的预期情况。

关于神经阻滞导管

神经阻滞是指使用局部麻醉剂阻断某组神经的疼痛感。 局部麻醉剂是一种用于麻醉身体某个部位的药物。

连续神经阻滞通过一根与泵相连的导管（柔性细管）给药。 连续神经阻滞可持续数天，帮助您减轻术后疼痛。

您的麻醉师将调整您的麻醉泵，为您提供适量的局部麻醉剂。 麻醉师是受过特殊医学培训的医生，可以在手术前、手术期间和手术后帮助您止痛。 您所需要的药物剂量可能比正常情况更多或更少，具体取决于您术后的疼痛程度。

连续上肢神经阻滞可阻断上肢（肩膀、手臂或手部）神经的痛感。 局部麻醉剂通过放置在颈部附近的神经阻滞导管到达这些神经。

连续上肢神经阻滞可以消除大部分疼痛， 但无法完全消除疼痛。 在接受神经阻滞治疗期间，您可能还需要服用止痛药。

手术后可能发生的情况

神经阻滞导管将在手术期间置入。 手术后，肩膀、手臂或手部有麻木感是正常的。

进行手术一侧的面部或颈部可能会有麻木感。 您还可能会出现声音嘶哑、眼睑下垂、瞳孔缩小或鼻塞等情况。 这些都是局部麻醉剂导致的 正常现象， 会在取出神经阻滞导管后消失。

术中使用的强效局部麻醉剂会在术后约 8 至 16 小时失效。 届时，您将能更轻松地活动肩膀、手臂或手部。 在恢复感觉的过程中，您可能会感到些许不适。 护士会调整您的麻醉

泵，通过神经阻滞导管为您进行局部麻醉。 他们还可能会为您提供止痛药，帮助您缓解任何不适。

术后第一晚睡觉前，让护士为您提供止痛药。 这将有助于防止您在麻木感消失后痛醒。

置入神经阻滞导管后的预期情况

- 神经阻滞导管周围可能会渗出一些液体。 这些液体是局部麻醉剂。 这是正常现象，并不意味着导管不起作用。 如果发现神经阻滞导管漏液，请告知您的护士。
- 您的神经阻滞导管可能会意外脱落或被拔出。 如果发生该情况，请告知您的护士。 请勿丢弃您的导管。
- 切记时刻注意您的肩膀、手臂或手部的位置。 由于使用了局部麻醉剂，您将无法完全感觉到它们。 请避免这些部位受伤。 如果护士为您提供了悬带，请始终将手臂放在悬带中，接受物理治疗时除外。
- 如果感觉肩膀、手臂或手部完全麻木，请告知您的护士。 您的泵可能需要关闭一段时间。 在您的手臂恢复知觉后，即可重新将泵打开。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果出现以下任何一种情况，请您联系您的医疗保健提供者：

- 呼吸困难或胸痛。
- 身体任何部位出现皮疹或荨麻疹。
- 嘴巴周围产生麻木感。
- 口腔中有金属味。
- 耳鸣。
- 感觉头昏眼花。
- 意识模糊。
- 口齿不清。
- 身体任何部位抽搐。
- 癫痫发作（出现无法控制的颤抖或僵硬）。

联系信息

如果您有任何疑问或担忧，请致电 212-639-6851 联系麻醉疼痛服务。 您可在周一至周五上午 9 点至下午 4 点联系到工作人员。下午 4 点以后和周末以及节假日，请致电 212-639-2000，要求值班的麻醉疼痛科医生接线。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利