



患者及照护者教育

关于莫氏手术

本信息描述了在 Memorial Sloan Kettering (MSK) 接受莫氏手术之前、期间和之后的预期情况。

关于莫氏手术

莫氏手术是一种治疗某些皮肤癌的手术。这些皮肤癌包括基底细胞癌和鳞状细胞癌。该手术采用一种特殊技术，可以在切除所有皮肤癌组织的同时尽可能多地保留健康组织。这有助于减少瘢痕形成。

莫氏手术是治疗皮肤癌最有效的方法。

手术期间，术者将从您的皮肤上切除一层组织，然后通过显微镜检查有无癌细胞。如果有癌细胞，则将切除更多层组织，然后再次检查有无癌细胞。这一过程将持续至皮肤癌组织全部切除且边缘清晰为止。

莫氏手术是一项门诊程序，所以您不需要住院。手术期间不会对您进行全身麻醉（使用药物使您入睡）。您将接受局部麻醉剂（一种使身体某个部位麻木的药物）。如需了解更多信息，请查看 *Understanding Skin Cancer and Mohs Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/understanding-skin-cancer-and-mohs-surgery)

莫氏手术的风险

请与您的医疗保健提供者讨论莫氏手术的风险。可能存在的风险包括：

- 手术部位疼痛或压痛
- 感染
- 手术部位出血
- 瘢痕

- 伤口愈合缓慢或不佳
- 手术部位麻木
- 切口（手术切口）处的伤口裂开。只有在伤口被缝合的情况下才会有此风险。

莫氏手术前

您将获得有关如何为手术做好准备的信息。您将有时间查看这些信息并提出问题。如果您需要整形外科医生为您缝合伤口，您还将获得更多信息。

医疗保健提供者将会审查您的用药情况和病史。

如果您在手术前出现任何不适（发热、感冒、喉咙痛或流感）或在住院，请致电您的医疗保健提供者办公室。

根据需要切除的组织层数，您可能在 MSK 逗留数个小时。我们建议您在就诊当天吃早餐并携带午餐或零食。如有需要，您也可以将食物存放在我们的冰箱中。

如有任何疑问，请致电医疗保健提供者办公室。

莫氏手术当天

手术时间的长短取决于切除的组织层数。部分患者可能需要在 MSK 逗留一整天

莫氏手术期间

首先，我们会为您注射局部麻醉剂来麻痹手术部位。麻痹该部位后，将切除癌组织和周围一层较薄的组织。您的伤口将会包覆绷带。

伤口包扎好后，您会留在手术室或被带到等候区。您可以在等待时放松片刻，吃些小零食或午餐。

实验室将对切除的组织进行处理。组织处理完毕后，负责莫氏手术的外科医生会检查所有边缘。如果组织边缘（边界）有癌细胞，则需要再切除一层组织。

这些步骤将重复进行，直到所切除组织的边缘再无癌细胞。

闭合伤口

癌症组织全部切除后，您和外科医生将讨论伤口闭合及愈合的最佳方法。

您的外科医生可能需要使用缝线、皮肤胶水或皮肤移植来闭合您的伤口。有些伤口也可能自行愈合，无需进行额外修复。

如果您需要整形外科医生为您闭合伤口，必须提前规划。

您的医疗保健提供者会指导您如何在家护理伤口。

莫氏手术后

手术后，您可以立即回家。

您的医疗保健提供者将：

- 告知您何时复诊。复诊期间，医疗保健提供者可能会为您拆线。您的医疗保健提供者会继续监测您的愈合情况。
- 为您提供可安全服用的止痛或消肿药物。
- 提供指导说明，告知您在一段时间内停止或减少体力活动。

手术后请勿旅行。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Mohs Surgery - Last updated on November 30, 2023

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利