Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

关于莫氏手术

本信息描述了在 Memorial Sloan Kettering (MSK) 接受莫氏手术之前、期间和之后的预期情况。

关于莫氏手术

莫氏手术是一种治疗某些皮肤癌的手术。 这些皮肤癌包括基底细胞癌和鳞状细胞癌。该手术采用一种特殊技术，可以在切除所有皮肤癌组织的同时尽可能多地保留健康组织。这有助于减少瘢痕形成。

莫氏手术是治疗皮肤癌最有效的方法。

手术期间，术者将从您的皮肤上切除一层组织，然后通过显微镜检查有无癌细胞。 如果有癌细胞，则将切除更多层组织，然后再次检查有无癌细胞。 这一过程将持续至皮肤癌组织全部切除且边缘清晰为止。

莫氏手术是一项门诊程序，所以您不需要住院。 手术期间不会对您进行全身麻醉（使用药物使您入睡）。 您将接受局部麻醉剂（一种使身体某个部位麻木的药物）。 如需了解更多信息，请查看*Understanding Skin Cancer and Mohs Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/understanding-skin-cancer-and-mohs-surgery)

莫氏手术的风险

请与您的医疗保健提供者讨论莫氏手术的风险。 可能存在的风险包括：

- 手术部位疼痛或压痛
- 感染
- 手术部位出血
- 瘢痕

- 伤口愈合缓慢或不佳
- 手术部位麻木
- 切口（手术切口）处的伤口裂开。 只有在伤口被缝合的情况下才会有此风险。

莫氏手术前

您将获得有关如何为手术做好准备的信息。 您将有时间查看这些信息并提出问题。 如果您需要整形外科医生为您缝合伤口，您还将获得更多信息。

医疗保健提供者将会审查您的用药情况和病史。

如果您在手术前出现任何不适（发热、感冒、喉咙痛或流感）或在住院，请致电您的医疗保健提供者办公室。

根据需要切除的组织层数，您可能会在 MSK 逗留数个小时。 我们建议您在就诊当天吃早餐并携带午餐或零食。 如有需要，您也可以将食物存放在我们的冰箱中。

如有任何疑问，请致电医疗保健提供者办公室。

莫氏手术当天

手术时间的长短取决于切除的组织层数。 部分患者可能需要在 MSK 逗留一整天

莫氏手术期间

首先，我们会为您注射局部麻醉剂来麻痹手术部位。 麻痹该部位后，将切除癌组织和周围一层较薄的组织。 您的伤口将会包覆绷带。

伤口包扎好后，您会留在手术室或被带到等候区。 您可以在等待时放松片刻，吃些小零食或午餐。

实验室将对切除的组织进行处理。 组织处理完毕后，负责莫氏手术的外科医生会检查所有边缘。 如果组织边缘（边界）有癌细胞，则需要再切除一层组织。

这些步骤将重复进行，直到所切除组织的边缘再无癌细胞。

闭合伤口

癌症组织全部切除后，您和外科医生将讨论伤口闭合及愈合的最佳方法。

您的外科医生可能需要使用缝线、皮肤胶水或皮肤移植来闭合您的伤口。 有些伤口也可能会自行愈合，无需进行额外修复。

如果您需要整形外科医生为您闭合伤口，必须提前规划。

您的医疗保健提供者会指导您如何在家护理伤口。

莫氏手术后

手术后，您可以立即回家。

您的医疗保健提供者将：

- 告知您何时复诊。 复诊期间，医疗保健提供者可能会为您拆线。 您的医疗保健提供者会继续监测您的愈合情况。
- 为您提供可安全服用的止痛或消肿药物。
- 提供指导说明，告知您在一段时间内停止或减少体力活动。

手术后请勿旅行。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Mohs Surgery - Last updated on November 30, 2023
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利