

患者及照护者教育

关于睾丸切除术

本指南将帮助您为将在 MSK 进行的睾丸切除术做好准备。 它还能帮您了解您在恢复期间的预期情况。

手术前请至少阅读本指南一次,并在手术前几天将其用作参考。

每次到访 MSK 时,包括手术当天,请随身携带本指南。 您和您的医疗团队会在整个医疗过程中参考本资源。

关于睾丸切除术

睾丸切除术是指切除单侧睾丸的手术。 双侧睾丸切除术是指切除双侧 睾丸的手术。

睾丸是呈卵圆形的器官,左右各一个,其主要功能是产生精子和分泌雄激素(见图 1)。睾丸切除术可通过阴囊(内含睪丸的囊状物)或腹股沟(位于腹部和大腿之间的区域)切口(手术切口)完成。




图 1. 生殖系统

为您的手术做好准备

本节信息将帮助您为手术做好准备。 请在安排好手术后阅读该信息。 随着手术的临近,请参考该信息。 其中包含您应该如何做好准备的重 要信息。

当您通读本节内容时,请写下希望向医疗保健提供者咨询的问题。

为您的手术做好准备

您和您的医疗团队将共同为手术做准备。即使您不确定,也请告知我们以下情况是否适用于您,以帮助我们保护您的安全。

- 我在使用抗凝剂(血液稀释剂药物),例如:
 - 阿司匹林
 - 肝素
 - 华法林 (Jantoven®、Coumadin®)

- 氯吡格雷 (波立维®)
- 依诺肝素 (Lovenox®)
- 达比加群 (泰毕全®)
- 阿哌沙班(艾乐妥®)
- 利伐沙班 (拜瑞妥®)
- 我在使用 SGLT2 抑制剂,例如:
 - 卡格列净 (Invokana®)
 - 达格列净 (Farxiga®)
 - 恩格列净 (Jardiance®)
 - 埃格列净 (Steglatro®)

- 以下是药物示例。还 有其他类型的血液稀 释药物。
- 请务必确保您的保健 提供者了解您正在服 用的所有药物。

- 我在使用处方药(包括贴剂和乳膏)。处方药是指只能凭医疗保健 提供者开具处方才可获得的药物。
- 我在使用非处方药(包括贴剂和乳膏)。非处方药是指无需开具处方即可购买的药物。
- 我在摄入膳食补充剂,比如草药、维生素、矿物质、天然或家庭疗法。
- 我装有起搏器、自动植入式心脏复律除颤器 (AICD) 或其他心脏装置。
- 我患有睡眠呼吸暂停。
- 我既往使用麻醉药出现过问题。手术期间,会对您进行麻醉(使用药物使您入睡)。
- 我对某些特定药物或材料(包括胶乳)过敏。
- 我不愿意接受输血。

- 我饮酒。
- 我吸烟或使用电子吸烟设备(如 vape pen 或电子烟)。
- 我服用娱乐性毒品,例如大麻。

关于饮酒

向保健提供者诚实说明您的饮酒量,这很重要。这将有助于我们为您制 定医疗照护计划。

如果您经常饮酒,您在手术过程中和手术后可能存在出现问题的风险。 其中包括出血、感染、心脏问题和住院时间延长。

如果您定期饮酒并突然戒酒,可能导致癫痫发作、谵妄和死亡。如果我们了解到您有出现这些问题的风险,我们可以开具处方药物来帮助预防。

您可以在术前采取以下措施来防止出现问题。

- 向保健提供者诚实说明您的饮酒量
- 当您的手术计划得到确定之后,请尝试停止饮酒。如果您出现以下情况,请立即告知您的医疗保健提供者:
 - 头痛。
 - 感觉恶心(感觉想吐)。
 - 感觉比平时更焦虑(紧张或担忧)。
 - 无法入睡。

这些均为戒酒的早期征兆,可以进行治疗。

- 如果您无法停止饮酒,请告知您的医疗保健提供者。
- 如有关于饮酒和手术的疑问,您都可咨询您的医疗保健提供者。我

们将一如既往地确保您所有医疗信息的保密性。

关于吸烟

如果您吸烟,接受手术时您可能会出现呼吸问题。 即使在手术前仅停止吸烟几天,都会对您有帮助。

如果您吸烟,您的医疗保健提供者会将您转诊至我们的烟草治疗项目。 您也可以致电 212-610-0507 与本项目取得联系。

关于睡眠呼吸暂停

睡眠呼吸暂停是一种常见的呼吸问题。 如果您患有睡眠呼吸暂停症,您会在睡眠期间短时间内停止呼吸。 最常见的类型是阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA)。 OSA 患者在睡眠期间会发生气道完全阻塞。

OSA 可在术中和术后引起一些严重问题。 请告知我们您是否患有或认为您可能患有睡眠呼吸暂停。 如果您使用呼吸机(如持续性正压呼吸器 (CPAP)),请在手术当天随身携带。

手术后 30 天内 术前检查 (PST)

您将在手术前进行 PST 预约。 您将从外科医生办公室收到预约日期、时间和地点的相关提醒。

您可以在预约 PST 当天进食和服用常规药物。

前去接受术前检查时,随身携带这些物品将对您有所帮助:

- 您服用的所有药物的清单,包括处方药、非处方药、贴片和药膏。
- 过去一年中在 MSK 以外进行的任何医学检查(如有)的结果。 示例 包括心脏负荷试验、超声心动图或颈动脉多普勒检查结果。
- 您的医疗保健提供者的名字和电话号码。

在 PST 预约期间,您将会见一位高级实践提供者 (APP)。 他们会与 MSK 的麻醉科医生密切合作。 在手术或医疗程序期间,这些经过专业培训的医生将为您施用麻醉药物。

您的 APP 会与您一起查看您的医疗和手术病史。 您可能需要接受一些 医学检查来安排您的照护事宜,例如:

- 心电图 (EKG),用于检查您的心律。
- 胸部 x 线检查。
- 血液检查。

您的 APP 可能会建议您去会见其他医疗保健提供者。 他们也会告知您手术日早晨应该服用哪些药物。

确定您的照护者

照护者在您的医疗护理中扮演着重要的角色。在手术前,您和您的照护者将从您的医疗保健提供者处了解您将接受的手术相关信息。手术结束后,您的照护者会在您出院后将您安全送回家中。他们还会帮助您居家照顾自己。

照护者须知



照顾正在接受癌症治疗的患者需要肩负许多责任。我们提供相关资源和支持服务,以帮助您更好地应对。请访问www.msk.org/caregivers 或阅读*A Guide for Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-

education/guide-caregivers),以了解更多信息。

填写医疗保健代理表格

如果您尚未填写医疗保健代理表格,我们建议您立即填写。如果您已经填写了一个或有任何其他预先指示,请将其带到您的下一次约会中。

医疗保健代理是一份法律文件。它说,如果你不能为自己沟通,谁会为你说话。这个人被称为您的医疗保健代理人。

- 要了解医疗保健代理和其他预先指示,请阅读 *癌症患者及其亲人的 预立医疗照护计划* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)。
- 要了解如何成为医疗保健代理,请阅读 *如何担任医疗护理代理人* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent)。

如果您对填写医疗保健代理表格有疑问,请与您的护理团队成员交谈。

做呼吸和咳嗽练习

手术前练习深呼吸和咳嗽。 您的医疗保健提供者将为您提供激励肺活量计,以帮助扩张您的肺部。 如需了解更多信息,请阅读*如何使用诱发性肺量计* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)。

进行体力活动

进行体力活动有助于您的身体达到最佳状态以迎接手术。 此外,还可以使您恢复得更快、更容易。

尽量每天进行体力活动。 任何使您心跳加快的运动(如散步、游泳或骑自行车)都是不错的选择。 如果外面很冷,可以使用家里的楼梯,或者前往商场或购物中心。

遵循健康饮食

手术前,应遵循均衡健康的饮食。 如果您需要饮食方面的帮助,请告 知保健提供者安排您与营养师和营养学家会面。

精子库

如果您在睾丸切除术后失去两个睾丸或您接受了双侧睾丸切除术,则您无法产生精子。 这意味着您无法生育亲生孩子。 手术前应考虑在精子库中储存您的精子。 请向护士咨询有关该流程的更多信息。 如需了解更多信息,请阅读资源 Building Your Family After Cancer Treatment: For People Born With Testicles (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/building-family-born-with-testicles)和 Sperm Banking (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sperm-banking)。

如果您在睾丸切除术后仍留有一个睾丸,您可能无需储存精子。 即您将可以产生生育子女所需的精子。

购买 4% 葡萄糖酸氯己定 (CHG) 溶液抗菌皮肤清洁剂,如洗必泰® 4% CHG 溶液是一种皮肤清洁剂,使用后可持续 24 小时杀死细菌。 手术前使用洗必泰淋浴将有助于降低术后感染风险。 您可以在当地药店购买 4% CHG 溶液抗菌皮肤清洁剂,无需处方。

手术前7天

遵循医疗保健提供者关于服用阿司匹林的指示

阿司匹林可能会导致出血。如果您在服用阿司匹林或含有阿司匹林的药物,您可能需要在手术前7天调整剂量或停止服用。请遵循医疗保健提供者的指导说明。未得到医疗保健提供者的指示时,请勿随意停用阿司匹林。

如需了解更多信息,请阅读*如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)。

停止服用维生素 E、复合维生素、草药和其他膳食补充剂

使用维生素 E、复合维生素、草药和其他膳食补充剂可能导致出血。请在手术前7天停用此类药物。如果您的医疗保健提供者为您提供了其他指导说明,请遵循相应说明。

如需了解更多信息,请阅读*草药疗法和癌症治疗* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)。

手术前 2 天 停用非甾体抗炎药 (NSAID)

使用 NSAID(如布洛芬(Advil[®] 和 Motrin[®])和萘普生 (Aleve[®]))可能导致出血。 请在手术前 2 天停用此类药物。 如果您的医疗保健提供者为您提供了其他指导说明,请遵循相应说明。

如需了解更多信息,请阅读*如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)。

手术前 **1** 天 留意手术时间

在手术前一天的下午 2 点后,工作人员将打电话给您。 如果您的手术 安排在星期一,他们会在前一个星期五致电给您。 如果您在晚上 7:00 前未接到电话,请致电 212-639-5014。

工作人员将告知您到达医院进行手术的时间。 他们还会提醒您接受手术的地点。

您的手术将在以下地点进行:

6 楼术前中心 (PSC) 约克大道 1275 号(东 67 大街与东 68 大街之间) 纽约市,邮编 NY 10065 请乘 B 电梯至 6 楼

使用 4% CHG 溶液抗菌皮肤清洁剂进行淋浴,如洗必泰

在手术前一晚睡前,请使用 4% CHG 溶液抗菌皮肤清洁剂进行淋浴。

- 1. 使用常用的洗发水和护发素洗头。 充分冲洗头部。
- 使用常用的肥皂清洗面部和生殖器(腹股沟)区域。用温水冲洗身体。
- 3. 打开 4% CHG 溶液的瓶子。 倒一些在您的手中或干净的毛巾上。
- 4. 请远离淋浴流。 从颈部到足部,将 4% CHG 溶液轻轻揉搓到身体上。 请勿将该溶液用在面部或生殖器区域。
- 5. 移回淋浴水流中将 4% CHG 溶液冲洗掉。 使用温水。
- 6. 用干净的毛巾擦干身体。

淋浴后请勿使用任何乳液、护肤霜、除臭剂、化妆品、粉扑、香水或古龙水。

睡眠

早点上床,睡个好觉。

术前饮食说明

- 抵达时间前8小时停止进食。
 - 医疗保健提供者可能会让您早点停止进食。 如被告



知,请遵循其指示。

- 在抵达时间前8小时,除以下清流质以外,请勿进食 或饮用任何东西:
 - 水。
 - 苏打。
 - 透明果汁(如柠檬水、苹果汁和蔓越莓汁)。 请勿 饮用橙汁或带果肉的果汁。
 - 黑咖啡或茶(不含任何牛奶或奶精)。
 - 运动饮品,如佳得乐 Gatorade®。
 - 果冻,比如 Jell-O®。

您可以持续饮用,直至抵达时间前 2 小时。

手术当天早晨 术前液体摄入指导说明



抵达时间前2小时停止饮用。包括水。

遵医嘱服药

您的医疗团队成员将告知您手术当天早晨应服用哪些药物。 只在服药时喝一小口水。 具体取决于您通常服用的药物,可能是全部、部分或者不是您平时在早上服用的药物。

使用 4% CHG 溶液抗菌皮肤清洁剂进行淋浴,如洗必泰

在前往医院前使用 4% CHG 溶液抗菌皮肤清洁剂进行淋浴。使用方法与前一晚相同。

淋浴后请勿使用任何乳液、护肤霜、除臭剂、化妆品、粉扑、香水或古龙水。

注意事项

- 穿着舒适宽松的衣服。
- 如果您平时戴隐形眼镜,请用镜框眼镜代替。手术期间配戴隐形眼镜可能会对眼睛造成伤害。
- 不要穿戴任何金属物品。 摘除所有饰物,包括穿体装饰。 手术过程 中使用的设备如果接触到金属,可能会导致灼伤。
- 请勿使用任何乳液、护肤霜、除臭剂、化妆品、粉扑、香水或古龙水。
- 请将贵重物品(如信用卡、首饰和支票簿)留在家中。

随身携带的物品

- 一条宽松的裤子(比如宽松的运动裤)。
- 宽松的三角内裤。
- (如果您有的话)用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机(例如 CPAP 机)。
- 您的医疗授权书表和其他预立医疗指示(如果您已完成)。
- 手机和充电器。
- 只需要带小额现金用于购买小物件(如报纸)。
- 个人物品(例如眼镜、助听器、假牙、假肢、假发和宗教用品)的 收纳盒(如有的话)。
- 您在家服用的药物的清单。

本指南。您的医疗团队将使用本指南来指导您如何在术后进行自我 护理。

泊车位置

MSK 的停车场位于约克大道和 第一大道之间的东 66 大街。 如果您对价格有疑问,请致电 212-639-2338

要到达停车场,请从约克大道 转入东66大街。停车场距离 约克大道约四分之一街区, 位 干大街的右侧(北侧)。 有一 条隧道连接车库和医院,可供 您步行通行。



M = Memorial Sloan Kettering

其他停车场位干:

- 东69大街(第一大道和第二大道之间)。
- 东67大街(约克大道和第一大道之间)。
- 东65大街(第一大道和第二大道之间)。

当您到达医院后

抵达医院后,请乘 B 电梯到达 6 楼。在 PSC 候诊室的服务台进行登 记。

我们将多次请您说出并拼出您的姓名和出生日期。 这是为了保障您的 安全。因为姓名相同或相似的患者可能会与您同一天接受手术。

手术着装

当到您该为手术更衣时,我们会为您提供医院病号服、长袍和防滑袜更换。

与护士见面

您将在手术之前与您的护士见面。请将您在午夜(凌晨 12:00)之后服用的任何药物的剂量及服用时间告知他们。请确保包括处方药、非处方药、贴片和药膏。

护士可能会在您的一根静脉中放置一根静脉注射 (IV) 管线,通常是您的手臂或手上的静脉。如果护士没有放置静脉注射管路,麻醉师可能会在手术室里进行此操作。

与麻醉师见面

在手术前,您将与麻醉师见面。他们将会:

- 与您一起查看您的病史。
- 询问您既往使用麻醉药是否曾出现过问题。包括恶心(感觉想吐)或疼痛。
- 和您谈论手术过程中的舒适度和安全性。
- 和您谈论您将接受哪种麻醉。
- 回答您提出的麻醉相关问题。

医生或麻醉师也可能会与您讨论将一根硬膜外导管(细软管)置入脊柱(背部)的问题。 硬膜外导管是另一种在手术后给您止痛的方法。

为手术做好准备

到了做手术的时间,您将需要取下眼镜、助听器、假牙、假体装置、假 发和宗教用品。

您将自己走进手术室,或者躺在担架上被工作人员抬入手术室。 手术

室团队有一名成员会帮助您上手术台。 工作人员会在您的小腿上套上 气压靴。 它们可以缓慢充气或放气,促进您腿部的血液循环。

当您感觉舒适后,麻醉师会通过您的静脉注射管线为您施用麻醉药,让 您入睡。 在手术过程中和手术后,您还将通过静脉注射管线接受液体 输送。

手术期间

在您完全睡着后,我们将从您的嘴部放置一根呼吸管(抵达气管)来帮助您呼吸。

手术完成后,医生将使用缝线或缝合钉闭合切口。 可能还会在切口上使用 Steri-Strips™(手术胶带薄片)或 Dermabond®(手术胶水)。 切口可能会用绷带进行包覆。

呼吸管通常会在您还在手术室时被拔出。

术后恢复

本章节内容将帮助您了解术后可能发生的情况。 您将会了解如何从手 术中安全恢复(在医院和在家中)。

当您通读本节内容时,请写下希望向您的医疗保健提供者咨询的问题。

可能发生的情况

当您在手术后醒来时,您将在麻醉复苏室 (PACU) 待数小时,随后您将被送往复苏室。 手术当天即可出院。

护士会监控您的体温、脉搏、血压和氧气水平。 您可能会通过位于鼻子下方的一根细管或覆盖鼻子和嘴的面罩来获得氧气。 我们还会将压缩靴穿戴于您的小腿上。

填写您的恢复情况跟踪

我们希望了解您在离开医院后的情况。 为了帮助我们为您提供照护, 我们将向您的 MyMSK 账户发送一些问题。 我们将在您手术后 10 天内 每天发送。 这些问题被称为"恢复情况跟踪"。

请在每天午夜(凌晨 12:00)前完成恢复情况跟踪。 您只需花费 2 至 3 分钟即可完成。 您对这些问题的回答将有助于我们了解您的感受和您的需求。

根据您的回答,我们可能会联系您,以便了解更多信息。 有时,我们可能会请您致电您的外科医生办公室。 如果您有任何问题,请随时联系您的外科医生办公室。

如需了解更多信息,请阅读*Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker)。

管理疼痛

您的医疗保健提供者将经常询问您的疼痛情况,并在住院期间根据需要给您用药。 如果您的疼痛没有缓解,请告知医疗保健提供者。 控制疼痛非常重要,这样您就可以更好地恢复。

您会在离开医院之前拿到止痛药处方。 与您的医生或护士讨论可能的 副作用以及您应该何时开始转换为非处方止痛药。

您的阴囊或腹股沟会出现肿胀和瘀血。 疼痛或不适的时间长短因人而 异。

请遵循以下指南,帮助您居家管理疼痛。

手术后,您的护士可能会为您提供一个阴囊托或具有支撑作用的敷

- 料来帮助提高舒适度并固定绷带。 戴上阴囊托的时间应持续 48 小时(2 天)。 48 小时后,请穿着宽松的三角内裤。
- 术后 24 小时内,请对阴囊或腹股沟进行冰敷。冰敷有助于缓解肿胀和瘀血。将冰袋用软布包裹后,将其敷在阴囊区域 10 分钟。然后,将其取下 10 分钟。如果需要,可再次进行冰敷。一次冰敷持续时间请勿超过 10 分钟。
- 请根据医嘱和需要服用止痛药。
- 如果为您开具的处方药不能缓解疼痛,请致电您的医疗保健提供者。
- 服用处方止痛药期间,请勿驾驶车辆或饮酒。 一些处方止痛药可能 会使您感到困倦。 酒精会加重困倦。
- 随着切口逐渐愈合,您的疼痛会减轻,所需的止痛药也会减少。 非处方止痛药,如对乙酰氨基酚 (Tylenol®) 或布洛芬 (Advil®) 可减轻疼痛和不适。
 - 请按照您的医疗保健提供者的指示停用处方止痛药。
 - 请勿服用超过说明书上指示或您的医疗保健提供者指导剂量的任何药物。
 - 阅读您正在服用的所有药物的说明书,尤其是如果您正在服用对乙酰氨基酚。对乙酰氨基酚是一种在很多非处方药和处方药中十分常见的成分。但过量服用会伤肝。在未与您的医疗保健团队成员讨论的情况下,请勿使用超过1种含有对乙酰氨基酚的药物。
- 止痛药会有助于您恢复正常活动。 服用足够的药物,帮助您提高活动和锻炼的舒适度。 当您开始活动时,您的疼痛会稍有增加,这是正常的。
- 记录您服用止痛药的时间。 服用后 30 至 45 分钟效果最佳。 当疼痛

出现后马上服用止痛药会比等待疼痛加重时再服用效果要好。

一些处方止痛药(如阿片类药物)可能会引起便秘(排便比平时少)。 请勿用力排便。

预防和管理便秘

与您的医疗保健提供者讨论如何预防和管理便秘。 您也可以遵循以下 指南。

- 每天在同一时间上厕所。 这样您的身体就会习惯每天在同一时间上 厕所。 但如果在您有便意的时候,请立即上厕所。
- 尽量在餐后5至15分钟的时间上厕所。早餐后是适合排便的时间。
 此时,您的结肠反射最强。
- 如果可以,尝试进行锻炼。 散步是一个极好的锻炼方法。
- 如果可以,每天饮用8至10(8盎司)杯(2升)水。您可以饮用水、果汁(例如李子汁)、汤、冰淇淋奶昔和其他不含咖啡因的饮品。含咖啡因的饮品(例如咖啡和苏打水),会排出体内的水分。
- 逐渐增加饮食中的纤维摄入量,最终达到 25 到 35 克每天。如果您进行过造口术或最近做过肠道手术,请在改变您的饮食之前咨询您的医疗保健提供者。富含纤维的食物包括:
 - 麸皮
 - 全麦谷物或面包
 - 带皮水果和蔬菜
 - 混合蔬菜沙拉
 - 杏、无花果和葡萄干
- 非处方药和处方药均可治疗便秘。 在服用任何治疗便秘的药物之

前,请咨询您的医疗保健提供者,尤其是如果您接受了造口术或肠 道手术。 请遵循标签上的说明或您的医疗保健提供者给您的指导说 明。 治疗便秘的非处方药物包括:

- 多库酯钠 (Colace®)。 这是一种大便软化剂(使您的排便变得更软的药物),几乎没有副作用。 您可以使用它来帮助预防便秘。 请勿同时服用矿物油。
- 聚乙二醇 (MiraLAX®)。 这是一种泻药(引起排便的药物),几乎 没有副作用。 用 8 盎司(1 杯)液体送服。 只有在您发生便秘之 后再服用该药。
- 番泻叶 (Senokot®)。 这是一种刺激性泻药,可引起痉挛。 最好在 睡前服用。 只有在您发生便秘之后再服用该药。

如果这些药物中的任何一种引起腹泻(稀便、水样便),请停止服用。 如果需要,您可以重新服用。

更多信息,请阅读资源*便秘* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/constipation)。

淋浴

您可以在术后 48 小时淋浴。 手术后 6 周内,请勿进行盆浴或将切口浸入水中。

淋浴时,请清洁切口。遵循上述步骤有助于促进愈合并防止感染。

- 1. 淋浴前或淋浴时,请取下包扎切口的绷带。 请将 Steri-Strips 保留在原位。 在覆盖切口的纱布垫上,您可能会看到轻微的血渍。 这是正常现象。
- 2. 用肥皂轻轻清洗切口。

- 3. 用缓慢的水流彻底冲洗。
- 4. 用干净的毛巾轻拍切口位置。
- 5. 查看切口时,可使用手持式镜子或请求他人协助。 下列副作用很常见并且会持续几天:
 - 轻微发红
 - 肿胀
 - 压痛
 - 瘀血
- 6. 在切口上放置一个纱布垫。 请勿使用胶带。 三角内裤会将纱布垫固定在适当位置。

请每天重复此过程,直至下次与医疗保健提供者进行随访预约。

切口的护理

请每天淋浴一次以清洁切口。 请遵循"淋浴"部分中的说明。

切口下方的皮肤有麻木感是正常的。 这是因为部分神经在手术过程中被切断。 随着时间的推移,麻木会逐渐消失。

如果您出现以下情况,请致电您的医疗保健提供者:

- 切口部位周围发红较为严重。
- 切口部位周围发红加重。
- 引流液看起来像脓液(稠厚和乳状)。
- 切口有恶臭(异味)。

如果您回家时切口内有缝合钉,您的医疗保健提供者将在术后第一次预约期间将其取出。 弄湿缝钉是可以的。

如果您出院回家时切口上有 Steri-Strips 或 Dermabond,它们会自行松动、脱落或剥落。 如果 10 天后它们仍未脱落,您可以自行将其取下。

饮食

除非您的医生给您其他指示,否则您可以恢复术前的常规饮食。 选择高热量和高蛋白的均衡饮食有助于术后恢复。 每餐尽量摄入足够的蛋白质来源(如肉、鱼或蛋)。 您也应该尝试吃水果、蔬菜和全谷类食物。

大量饮用液体也很重要。 选择不含酒精或咖啡因的液体。 每天尽量饮用 8 至 10 杯(8 盎司)液体。

如果您对饮食有任何疑问,请咨询临床营养师。

体力活动和运动

当您离开医院时,您的切口外表看起来已经愈合,但其内部还未愈合。 术后前 4 周:

- 请勿举起重量超过10磅(约4.5千克)的物体。
- 请勿做任何剧烈的活动(如慢跑、打网球等)。
- 请勿进行任何接触性运动(如足球)。

做有氧运动,如散步和爬楼梯,会帮助您恢复体力并感觉好一点。 每天至少步行 2-3 次,每次 20-30 分钟。 您可以在当地商场或购物中心的室外或室内散步。

手术后精力比平时少是正常的。 每个人恢复所需要的时间不同。 尽可能每天逐渐增加活动量。 始终平衡好活动期与休息期。 休息好是您帮助您恢复的重要部分。

驾驶

术后一周可以驾驶车辆。 当服用可能会让您昏昏欲睡的止痛药后,请 勿驾驶。 离开医院后,您可以随时乘车(而非驾车)。

返回工作岗位

与您的医疗保健提供者就您的工作进行讨论。 根据您所从事的工作,他们会告知您什么时候重返工作岗位是安全的。 如果您的工作涉及四处走动或举起重物,您可能需要等待更长的时间才能重返工作岗位。 如果您从事办公室工作,您或许可以尽早返回工作岗位。

情绪的管理

重病手术后,您可能会有一些新的心烦意乱的感觉。 很多人表示他们时不时会哭泣、悲伤、担心、紧张、易怒或生气。 您可能会发现有些情绪是您无法控制的。 如果发生这种情况,寻求情感支持是个好主意。 您的医疗保健提供者可以帮助您转诊至 MSK 的咨询中心。 您也可以致电 646-888-0200 与其取得联系。

应对的第一步是您需要谈论您的感受。 家人和朋友都可以给您提供帮助。 此外,我们还可以为您提供安慰、支持和指导。 让我们了解您、您的家人和朋友的感受是一个好主意。 我们有很多提供给您和您的家属的资源。 我们可以随时帮助您和您的家人以及朋友处理您疾病的情绪方面问题。 无论您是在医院还是居家,我们都可以提供帮助。

MyMSK 使用须知

MyMSK (my.mskcc.org) 是 MSK 患者门户网站。 您可以使用 MyMSK 发送和阅读您的医疗团队消息,查看您的检测结果,查看您的预约日期 和时间等。 您也可以邀请您的照护者创建他们自己的账户,以便他们 查看您的医疗照护信息。

如果您没有 MyMSK 帐户,可以前往 my.mskcc.org 进行注册。 您可以

通过致电 646-227-2593 或您的医生办公室获得注册 ID。

请观看 How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal (www.mskcc.org/cancer-care/patient-

education/video/how-enroll-mymsk-patient-portal),以了解更多信息。 您也可以通过发送电子邮件至 mymsk@mskcc.org 或致电 800-248-0593 联系 MyMSK 服务台。

何时应联系您的医疗保健提供者

如果出现以下情况,请联系您的医疗保健提供者:

- 发热 ≥ 100.5 °F (38 °C)。
- 腹股沟区域发红情况加重
- 阴囊或腹股沟区域肿胀加重,例如阴囊的大小超过一个小橙子的大小。 小。
- 切口出现分泌物,例如出血增加或有脓液。
- 排尿困难。
- 便秘。
- 切口出血,且流出的血液浸湿纱布垫。
- 任何疑问或担忧。

周一至周五上午 9:00 至下午 5:00,请联系您的医疗保健提供者办公室。

下午 5:00 后,以及周末和节假日,请致电 212-639-2000,并请求值班工作人员帮您联系您的医疗保健提供者。

支持服务

本章节包含支持服务清单。 这将有助于您为手术做好准备并在术后恢 复。

当您通读本节内容时,请写下希望向医疗保健提供者咨询的问题。

MSK 支持服务

入院处

212-639-7606

如果您对住院有任何疑问,包括要求提供私人病房,请致电联系我们。

麻醉科

212-639-6840

如果您对麻醉有任何疑问,请致电联系我们。

献血室

212-639-7643

如果您有兴趣捐献血液或血小板,请致电了解相关信息。

Bobst 国际中心

332-699-7968

我们欢迎世界各地的患者,同时提供众多服务来为您提供帮助。 如果 您是一名国际患者,请致电我们来帮助安排您的医疗照护。

咨询中心

www.msk.org/counseling

646-888-0200

许多人发现咨询服务很有帮助。 我们的咨询中心为个人、夫妇、家庭和团体提供咨询服务。 如果您感到焦虑或抑郁,我们也可以为您开具一些药物以提供帮助。 请向您的医疗团队成员请求转诊,或致电上述电话号码以进行预约。

食品援助项目

646-888-8055

我们为癌症治疗期间有需要的人士提供食物。 请咨询您的医疗团队成员,或致电上述电话号码以了解更多信息。

综合医学服务

www.msk.org/integrativemedicine

我们的综合医学服务为您提供多种服务来补充传统医疗照护。例如, 我们提供音乐疗法、心智/身体疗法、舞蹈和运动疗法、瑜伽和触摸疗 法。请致电 646-449-1010 预约上述服务。

您还可以预约咨询综合医学服务部的医疗保健提供者。 他们将与您一起制定计划,以打造健康的生活方式并管理副作用。 请致电 646-608-8550 预约咨询。

MSK 图书馆

library.mskcc.org

212-639-7439

您可以访问我们的图书馆网站或致电咨询图书馆工作人员。 他们可以帮助您找到更多关于某种类型的癌症的信息。 此外,您还可以访问图书馆的《患者和医疗保健消费者教育指南》。

营养服务

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

通过我们的营养服务,您可以向我们的临床营养师进行营养相关咨询。 您的临床营养师将与您讨论您的饮食习惯。 他们还将给出治疗期间和 治疗之后的饮食建议。 请向您的医疗团队成员请求转诊,或致电上述 电话号码以进行预约。

患者和社区教育

www.msk.org/pe

请访问我们的患者和社区教育网站,搜索教育资源、视频和在线项目。

患者账单计费

646-227-3378

如果您对保险公司预授权有任何问题,可致电询问。 预授权也称为预批准。

患者代表办公室

212-639-7202

如果您有关于医疗护理委任书的任何问题,或者对您的医疗照护有任何顾虑,请致电患者代表办公室。

围手术期的护士联络

212-639-5935

如果您对手术期间 MSK 披露的任何信息有任何疑问,请致电联系我们。

私人护士和陪护

917-862-6373

您可以申请私人护士或陪护在医院和家中照护您。 请致电以了解更多信息。

康复服务

www.msk.org/rehabilitation

癌症和癌症治疗会导致您的身体感到虚弱、僵硬或紧绷。 某些情况下会引发淋巴水肿(肿胀)。 我们的理疗医生(康复医学医生)、职业治疗师 (OT) 和物理治疗师 (PT) 可帮助您恢复正常活动。

- 康复医学医生负责诊断和治疗影响您运动和活动的相关问题。他们可以设计并帮助协调您的康复治疗方案,无论是在 MSK 还是在离家更近的地方均可。请致电 646-888-1929 联系康复医学(物理康复科)以了解更多信息。
- 如果您无法进行日常活动,职业治疗师可以为您提供帮助。例如,他们可以推荐一些工具来帮助简化日常工作。物理治疗师可以教您锻炼身体,帮助您增强力量和灵活性。请致电 646-888-1900 联系康复治疗以了解更多信息。

癌症治疗后的生活资源 (RLAC) 项目

646-888-8106

在 MSK,我们会在治疗结束后持续为您提供医疗照护。 RLAC 项目专为已经完成治疗的患者及其家属设计。

此项目可提供多项服务。 我们提供与完成治疗后的生活相关的研讨会、讲习班、支持小组和咨询服务。 还提供有关保险和就业问题的帮助。

性健康项目

癌症和癌症治疗可能会影响您的性健康、生育能力或两者兼有。 MSK 的性健康项目可在治疗前、治疗期间或治疗后为您提供帮助。

- 我们的女性性医学和女性健康项目可以为您提供性健康问题相关帮助,比如过早绝经或生育问题。请向您的 MSK 医疗团队成员咨询转诊事宜,或致电 646-888-5076 了解更多信息。
- 我们的男性性医学和生殖医学项目可以为您提供性健康相关问题的帮助,比如勃起功能障碍 (ED)。请向您的医疗团队成员咨询转介事宜,或致电 646-888-6024 了解更多信息。

社会工作

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

社会工作者可帮助患者、其家庭和朋友处理癌症患者常遇到的问题。 他们可在整个治疗过程中为您提供个人咨询和支持小组服务。 他们可 以帮助您与孩子和其他家庭成员进行沟通。

我们的社工还可以帮助您转诊至社区机构和相关项目。 如果您在支付账单方面遇到困难,他们也可以为您提供财务资源方面的信息。 请致电上述电话号码以了解更多信息。

精神照护

212-639-5982

我们的牧师(宗教信仰咨询师)可以倾听、帮助支持家庭成员和祈祷。他们可以帮您联系社区神职人员或信仰团体,或者作为您的同伴,为您带来精神上的慰藉。任何人都可以请求获得精神支持。您不必有宗教信仰(与某宗教有关)。

MSK 的多信仰教堂位于 Memorial Hospital 的大厅附近。 每天 24 小时开放。 如果您有紧急情况,请致电 212-639-2000, 联系值班牧师。

烟草治疗项目

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

如果您想戒烟,MSK 的专家可以为您提供帮助。 请致电以了解更多信息。

线上项目

www.msk.org/vp

我们可以为患者和照护者提供在线教育和支持。 这些均为现场直播会

议,您可以发表言论或者仅收听。 您可以了解您的诊断、治疗期间的 预期情况以及如何为癌症护理做好准备。

会议全程保密且免费,并由相关领域专家主持开展。 请访问我们的网站以获取有关线上项目的更多信息,或进行注册。

外部支持服务

Access-A-Ride

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

877-337-2017

在纽约市,MTA 为无法乘坐公共汽车或地铁的残疾人提供共享的乘车、上门服务。

Air Charity Network

www.aircharitynetwork.org

877-621-7177

提供往返治疗中心的交通。

美国癌症协会 (ACS)

www.cancer.org

800-ACS-2345 (800-227-2345)

提供各种信息和服务,包括 Hope Lodge,Hope Lodge 是为患者和照护者在癌症治疗期间提供免费的住所。

癌症和工作

www.cancerandcareers.org

646-929-8032

为有工作的癌症患者提供的教育、工具和活动资源。

癌症*照护*

www.cancercare.org

800-813-4673

第七大道 275 号 (西 25 和 26 大街之间)

纽约,邮编NY10001

提供咨询、支持小组、教育研讨会、刊物和财政援助。

癌症支持社区

www.cancersupportcommunity.org

为癌症患者提供支持和教育。

看护者行动网络

www.caregiveraction.org

800-896-3650

为照顾患有慢性疾病或残疾的亲人的人提供教育和支持。

企业天使网络

www.corpangelnetwork.org

866-328-1313

使用公司专机上的空座位,为患者提供免费的全国治疗交通。

Good Days

www.mygooddays.org

877-968-7233

为治疗期间的保险分摊费用提供经济援助。 患者必须有医疗保险,符合收入标准,并有开具了处方的药物(需为 Good Day 处方集涵盖的药物)。

HealthWell 基金会

www.healthwellfoundation.org

800-675-8416

提供财政援助,以支付保险分摊费用、医保费和某些药物和治疗的免赔 额。

Joe's House

www.joeshouse.org

877-563-7468

为癌症患者及其家属提供治疗中心附近住所的清单。

LGBT 癌症项目

www.lgbtcancer.com

为 LGBT 社区提供支持和倡导,包括在线支持小组和 LGBT 友好型临床 试验数据库。

LIVESTRONG Fertility

www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services

855-744-7777

为癌症患者和幸存者提供生殖信息和支持(通常这些患者和幸存者的药物治疗会给他们带来不孕不育的相关风险)。

Look Good Feel Better 项目

www.lookgoodfeelbetter.org

800-395-LOOK (800-395-5665)

该项目提供研讨会,让您了解您可以做的事情,帮助您改善您对自己外表的看法。 如需了解更多信息或报名参加研讨会,请拨打上述号码或访问项目网站。

美国国家癌症研究所

www.cancer.gov

800-4-CANCER (800-422-6237)

国家 LGBT 癌症网络

www.cancer-network.org

为LGBT癌症幸存者和有风险的人提供教育、培训和宣传。

Needy Meds

www.needymeds.org

提供专利药和仿制药的患者援助项目的清单。

NYRx

www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm 向纽约州公共部门雇主中满足要求的雇员和退休人员提供处方药物福利。

患者保险网络 (PAN) 基金会

www.panfoundation.org

866-316-7263

为有保险的患者提供保险分摊费用相关的协助。

患者权益基金会

www.patientadvocate.org

800-532-5274

提供获得医疗照护、财政援助、保险援助、工作留用援助的机会,以及 获得国家保险不足资源目录的机会。

专业处方建议

www.pparx.org

888-477-2669

帮助无法获得处方药医保赔付但满足要求的患者获得免费或低价药物。

Red Door 社区(前称 Gilda's Club)

www.reddoorcommunity.org

212-647-9700

在这里,癌症患者可以通过网络、研讨会、讲座和社交活动找到社会和情感支持。

RxHope

www.rxhope.com

877-267-0517

提供援助,帮助人们获得他们难以负担的药物。

Triage Cancer

www.triagecancer.org

为癌症患者及其照护者提供法律、医疗和财务信息与资源。

教育资源

本节列有本指南中提到的教育资源。这有助于您为手术做好准备并在术后恢复。

当您阅读这些资源时,请写下希望向您的医疗保健提供者咨询的问题。

Common Questions About MSK's Recovery Tracker
 (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker)

● 如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油 (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)

- 便秘 (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/constipation)
- 草药疗法和癌症治疗(www.mskcc.org/zh-hans/cancercare/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Orchiectomy - Last updated on March 11, 2024 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利