



患者及照护者教育

关于子宫肌瘤栓塞术 (UFE)

本信息将帮助您为子宫肌瘤栓塞术做好准备。还将帮助您了解手术后的预期情况。

关于子宫肌瘤




图 1. 患有子宫肌瘤的女性生殖系统

子宫肌瘤是一种良性（非癌性）肿瘤。它们是从子宫平滑肌细胞中生长出来的肌肉和纤维组织。子宫肌瘤可能是微小的（非常小），也可能会像哈密瓜一样大。子宫肌瘤很少发生癌变。某些子宫肌瘤患者没有任何症状。其他患者则会出现以下症状：

- 阴道大量出血。
- 膀胱和肠道疼痛或受压。
- 腹部增大（非常大）。

- 丧失生育能力（生育亲生子女的能力）。

大多数情况下，未引发病状的子宫肌瘤不需要治疗。

关于子宫肌瘤的事实

- 子宫肌瘤最常见于 30-50 岁人群。
- 每 4 人中就有 1 人在生育期（育龄期）罹患子宫肌瘤。
- 黑人罹患子宫肌瘤的几率是白人、亚裔或西班牙裔的 2 到 3 倍。

什么是子宫肌瘤栓塞术 (UFE)?

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 是一种阻断子宫肌瘤动脉（血管）的手术。阻断子宫肌瘤的动脉可以阻止血液流向肌瘤。这会使肌瘤缩小。

子宫肌瘤栓塞术可能替代以下方法来治疗子宫肌瘤：

- 子宫切除术，即切除子宫的手术。
- 子宫肌瘤剔除术，即切除每个肌瘤的手术。

如果您怀孕了，则不应接受该医疗程序。医生仍在研究子宫肌瘤栓塞术对怀孕的影响。有些患者在接受这种手术后健康地怀孕了。如果将来生养孩子对您来说很重要，请在决定治疗前与您的医疗保健提供者沟通。

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 有风险吗？

所有医疗程序都可能存在风险。医生会与您讨论子宫肌瘤栓塞术

的风险，并回答您的任何问题。

以下是子宫肌瘤栓塞术后我们需要注意的一些体征：

- 疼痛和轻微发烧
 - 有些人在 UFE 后几天内可能会出现疼痛、痉挛或低烧（低于 100.4 °F）。这被称为栓塞后综合征。属于常见情况。我们会用止痛药和消肿消炎药进行治疗。
- 月经可能比预期提前停止
 - 有些人会闭经，即月经停止。这种情况在 35 岁以下的人群中并不常见。通常不会引起更年期症状，如潮热。
- 子宫内膜感染
 - 在极少数情况下，子宫内膜会受到感染。这称为子宫内膜炎，通常对抗生素反应良好。

关于子宫肌瘤栓塞术 (UFE)

介入放射科医生（又称为 IR 医生）将为您实施 UFE。IR 医生在使用影像引导下医疗程序诊断和治疗疾病方面接受过专门培训。影像检查包括 X 光、超声波扫描术、超声检查 (US)、磁共振成像 (MRI) 和计算机断层扫描 (CT)。

您将与为您进行 UFE 的 IR 医生会面。他们会向您解释医疗程序并回答您的问题。您需要签署一份知情同意书（一份表明您同意该手术并理解其风险的同意书）。

IR 医生会将导管穿入肌瘤的小动脉。他们会使用 X 光来引导导管到达正确的位置。然后，他们会通过导管向动脉注入（放入）非常小的微粒。这些微粒会阻断流向肌瘤的血液，使其萎缩。

手术将使用局部麻醉剂（麻痹身体某个部位的药物）。您还将接受静脉注射 (IV) 止痛和镇静药物，让您在手术过程中保持舒适。

手术当天您就可以回家。

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 前应完成的事项

询问用药情况

您可能需要在手术前停用某些常用药物。您需要与您的医疗保健提供者讨论停用哪些药物对您是安全的。

我们在下面列举了一些常见的例子，但还有其他类型。确保您的医疗团队了解您服用的所有处方药和非处方药。处方药是指只能凭医疗保健提供者开具处方才可获得的药物。非处方药是指无需开具处方即可购买的药物。



在手术前几天内正确服药非常重要。如果没有这样做，我们可能需要重新安排您的手术。

抗凝剂（血液稀释剂）

血液稀释剂是一种能改变血液凝结方式的药物。血液稀释剂通常用于预防心脏病发作、中风或由血栓引起的其他问题。

如果您服用血液稀释剂，请向医疗保健提供者咨询医疗程序前应该如何处理。他们可能会告诉您在医疗程序前的特定天数停止服用。这将取决于您所要接受的医疗程序类型和您使用血液稀释剂

的原因。

血液稀释剂示例如下： 还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。 请勿在未咨询您的医疗团队成员的情况下停用您的血液稀释剂药物。

<ul style="list-style-type: none">● 阿哌沙班 (艾乐妥®)● 阿司匹林● 塞来昔布 (西乐葆®)● 西洛他唑 (Pletal®)● 氯吡格雷 (波立维®)● 达比加群 (泰毕全®)● 达肝素 (法安明®)● 双嘧达莫 (潘生丁®)● 依度沙班 (Savaysa®)● 依诺肝素 (Lovenox®)● 磺达肝癸钠 (Arixtra®)● 肝素注射 (针剂)	<ul style="list-style-type: none">● 美洛昔康 (莫比可®)● 非甾体抗炎药 (NSAID)，如布洛芬 (Advil®, Motrin®) 和萘普生 (Aleve®)● 己酮可可碱 (巡能泰®)● 普拉格雷 (Effient®)● 利伐沙班 (拜瑞妥®)● 柳氮磺胺吡啶 (Azulfidine®、Sulfazine®)● 替格瑞洛 (倍林达®)● 亭扎肝素 (Innohep®)● 华法林 (Jantoven®、Coumadin®)
---	--

其他药物和补充剂会改变血液凝固的方式。 示例包括维生素 E、鱼油和非甾体抗炎药 (NSAID)。 请阅读 *如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油*

(www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)。 其中的内容可以帮助您了解医疗程序前可能需要避免服用哪些药物和补充剂。

糖尿病药物

如果您服用胰岛素或其他糖尿病药物，请与您的 MSK 医疗保健提供者和开具处方的医疗保健提供者沟通。询问手术或医疗程序前应该做什么。您可能需要停止服用这类药物，或服用与平时不同的剂量。在手术或医疗程序前，您可能还需要遵循不同的饮食指示。请遵循医疗保健提供者的指导说明。

您的医疗团队会在手术或医疗程序期间检查您的血糖水平。

GLP-1 减肥药

如果您服用 GLP-1 药物，请务必告知您的医疗保健提供者。在手术或医疗程序前，您将需要遵循特殊的饮食指示。遵循这些指导说明非常重要。如果没有遵循指导说明，您的手术或医疗程序可能会被推迟或取消。

- 在手术或医疗程序前一天，请遵循清流质饮食。请勿食用固体食物。如需了解更多信息，请阅读 [清流质饮食 \(www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet\)](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet)。
- 抵达时间前 8 小时停止饮用。之后请勿摄入任何东西，包括清流质。您可以喝几小口水送服药物。

如需了解更多信息，请阅读 [服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序前的饮食须知 \(www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines\)](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)。

以下是一些 GLP-1 药物示例。还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。有时，开具这些

药物用于帮助控制糖尿病或其他疾病。有时，也会用于减肥。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 塞马格鲁肽 (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)● 度拉糖肽 (Trulicity®) | <ul style="list-style-type: none">● 替西帕肽 (Zepbound®, Mounjaro®)● 利拉鲁肽 (Saxenda®, Victoza®) |
|--|---|

利尿剂（水丸）

利尿剂是一种有助于控制体内液体积聚的药物。利尿剂通常用于治疗高血压或水肿。还可用于治疗某些特定心脏或肾脏问题。

如果您正在服用任何利尿剂，请在手术前咨询负责为您做手术的医疗保健提供者应如何处理。您可能需要在手术当天停用该药物。

我们在下面列举了一些常见的利尿剂示例。还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● 布美他尼 (Bumex®)● 呋塞米 (Lasix®) | <ul style="list-style-type: none">● 氢氯噻嗪 (Microzide®)● 螺内酯 (Aldactone®) |
|--|--|

取下皮肤上的医疗设备

您可能在皮肤上佩戴了某些医疗设备。在进行医疗程序、手术或扫描之前，某些医疗设备制造商会建议您取下：

- 连续血糖监测仪 (CGM)
- 胰岛素泵

您可以与您的医疗保健提供者讨论将您的预约安排在更接近您需要更换这些设备的日期。确保携带一个额外设备，以便在医疗程序、手术或扫描后佩戴。

您可能不确定如何在不佩戴设备时管理您的血糖。 如果不确定，请在预约前询问治疗您糖尿病的医疗保健服务提供者。

停用非甾体抗炎药 (NSAID)

使用 NSAID（如布洛芬（Advil[®] 和 Motrin[®]）和萘普生 (Aleve[®])) 可能导致出血。 请在手术前 2 天停用此类药物。 如果您的医疗保健提供者为您提供了其他指导说明，请遵循相应说明。

如需了解更多信息，请阅读 *如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)。

对造影剂的反应

造影剂是一种特殊的染料，可以让 IR 医生更容易地观察到您内脏器官的差异。 内脏是您身体内部的器官。 该手术通常使用造影剂。

有些人可能会对造影剂产生过敏反应。 大多数反应较为轻微，如麻疹等。

有些人可能会出现非常罕见但更严重的反应，如过敏性反应。 这是一种严重的过敏反应，可导致低血压（血压骤降）或呼吸困难。

过敏性反应可使用肾上腺素自动注射器（通常被称为 EpiPen[®]）进行治疗。 这是一种向肌肉注射肾上腺素的方法。

如果您过去曾对造影剂发生过敏反应，请告知您的医疗保健提供

者。您可能需要在手术前服用药物，以帮助缓解过敏。

安排人接您回家

疗程后请务必确保有一名负责的照护者接您回家。负责的照护者必须能够帮助您安全回到家中。如果他们有任何问题，应能够联系您的医疗团队。请务必在活检开始前将此事安排好。

如果没有负责的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或使用汽车服务，但必须保证有一个负责的照护者陪同。

纽约地区服务机构

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

新泽西地区服务机构

Caring People: 877-227-4649

如果您有任何生病不适请告知我们

如果您在手术前出现任何不适（包括发烧、感冒、喉咙痛或流感），请致电您的 IR 医生。您可以在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 致电联系。

下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000。联系值班的介入放射科医生。

请记住您的预约时间

工作人员会在手术前 2 个工作日给您打电话。如果您的手术安排在周一，他们会在前一个周四致电您。他们将告知您应该于何时到达医院接受活检。他们还会提醒您抵达的地点。

如果您在活检前的工作日中午（中午 12 点）前仍未接到我们的来电，请致电 646-677-7001。如果您因任何原因需要取消医疗程序，请致电为您安排该医疗程序的医疗保健提供者。

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 前一天应完成的事项

进食指导说明

重要信息：如果您服用 GLP-1 药物，请勿遵循以下说明。请遵循服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序前的饮食须知 (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)中的说明。



手术或医疗程序前的午夜（凌晨 12 点）后请停止进食。其中包括硬糖和口香糖。

您的医疗保健提供者可能会就何时停止进食给出不同的指示。如被告知，请遵循其指示。有些人需要在手术或医疗程序前禁食（不吃东西）更长时间。

用于避免造影剂反应的药物

您的医生可能已告诉您应服用药物以避免对造影剂产生过敏反应。如果情况如此，请在计划到达医院时间前 13 小时服用首剂药物。在到达前 2 小时服用第二剂。

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 当天应完成的事项

液体摄入指导说明

重要信息：如果您服用 GLP-1 药物，请勿遵循以下说明。请遵循服用 GLP-1 药物时，手术或医疗程序前的饮食须知 (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)中的说明。

午夜（凌晨 12 点）至抵达时间前 2 小时，只能饮用以下所列的液体。请勿进食或饮用其他任何饮品。抵达时间前 2 小时停止饮用。

- 水。
- 透明的苹果汁、葡萄汁或蔓越莓汁。
- Gatorade 或 Powerade。
- 黑咖啡或清茶。可以添加糖。请勿添加任何其他东西。
 - 请勿添加任何含量任何类型的牛奶或奶精。包括植物奶和奶精。
 - 请勿添加风味糖浆。

如果您患有糖尿病，请注意这类饮料中的含糖量。如果摄入这类饮料的无糖、低糖或无添加糖版本，会更容易控制血糖水平。

在手术和医疗程序前保持水分会有所帮助，因此如果口渴请饮用液体。请勿摄入超出所需的饮水量。手术或医疗程序期间，您将接受静脉 (IV) 输液。



抵达时间前 2 小时停止饮用。其中包括水。

您的医疗保健提供者可能会就何时停止饮水给出不同的指示。如被告知，请遵循其指示。

注意事项

- 在手术当天早晨，请遵循医疗保健提供者的用药说明指导。可以喝几口水送服。
- 如果您正在服用止痛药，请在手术前用几小口水送服。您可以服用对乙酰氨基酚 (Tylenol®)。请勿服用任何非甾体抗炎药，例如布洛芬 (Advil 和 Motrin) 和萘普生 (Aleve)。
- 请勿使用任何身体霜、乳液或凡士林 (Vaseline®)。您可以使用除臭剂和面部保湿剂。请不要化眼妆。
- 请勿穿戴任何金属物品。请取下所有首饰，包括身体穿孔。治疗过程中使用的器械如果接触到金属，可能会导致灼伤。
- 请将贵重物品留在家中。
- 如果您习惯配戴隐形眼镜，如果可能，请换成镜框眼镜。如果您没有镜框眼镜，请携带您的隐形眼镜盒。
- 穿着舒适宽松的衣服。

随身携带的物品

- 您居家服用的所有药物的清单，包括处方药、非处方药、贴片和药膏。
- 治疗您呼吸问题的药物（如吸入器）、治疗胸痛的药物或两者

兼有。

- 手机和充电器。
- 个人物品收纳盒（如有）。个人物品的示例包括眼镜或隐形眼镜、助听器、假牙、假肢、假发和宗教物品。
- 医疗护理委托书和其他预立医疗指示（如果您已填写完成）。
- 用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机（如使用），例如持续气道正压通气 (CPAP) 机。如果您不能随身携带，我们将在您住院期间为您提供。

抵达医院后的预期情况

多名医生、护士和其他工作人员会要求您说出并拼写出您的姓名和出生日期。这是为了保障您的安全。因为姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受医疗程序。

当您被带至术前区域时，您将领取医院病号服和防滑袜。您需要摘下眼镜、助听器、假牙、假肢、假发和宗教物品。

与护士会面

您将在治疗之前与您的护士见面。请将您在午夜（凌晨 12:00）之后服用的任何药物的剂量及服用时间告知他们。请确保包括处方药、非处方药、贴片和药膏。

护士将在您的手或手臂上置入静脉注射 (IV) 导管，除非您已置入有下列导管：

- 中央静脉导管 (CVC) 或任何其他类型的中央静脉导管。

- 经外周静脉置入中心静脉导管 (PICC)。
- 植入式输液港（也被称为 mediport 或 Port-A-Cath）。

您将在镇静剂的作用下接受手术。在镇静医疗程序下，您会注射镇静剂。这种药会让您在医疗程序过程中感到困倦和放松。医疗团队的一名成员将与您一起审查您的病史，为镇静做好准备。

他们将会：

- 询问您是否曾因镇静而出现过头问题。包括恶心（感觉想吐）或疼痛。
- 和您谈论手术过程中的舒适度和安全性。
- 和您谈论您将接受哪种镇静。
- 回答您关于镇静剂的任何问题。

手术期间的预期情况

到您做手术时，您将被带入手术室，医生会帮您躺在手术台上。您将会平躺在检查台上。

医疗团队的成员会在您的小腿上套上压缩靴。它们可以缓慢充气或放气，促进您腿部的血液循环。我们会为您连接上设备，以监测（记录）您的心率、呼吸和血压。您还将通过置于鼻子下方的细管接受氧气供给。

手术期间

医疗团队成员将清洁 IR 医生工作区域的皮肤。该区域被称为置管部位。插入部位可能在腹股沟（腹部和大腿之间的区域）。在某

些情况下，插入部位可能在您的手腕处。如有必要，医疗团队成员还会剃除插入部位的毛发。

我们会为您注射（注射）局部麻醉剂来麻痹置管部位。然后，IR 医生会将一根针插入麻木区域的动脉。他们会通过针头将导管穿入动脉。

IR 医生会引导导管，直到该导管到达为肌瘤供血的小动脉。他们会使用实时 X 光照片和注射造影剂来引导导管到达正确的位置。造影剂将帮助医生绘制出子宫肌瘤血管的图像。这称为动脉造影。

一旦导管到达正确的位置，IR 医生就会开始进行栓塞治疗。他们会在导管中注入栓塞（阻断）剂。栓塞剂是一种微小颗粒，每粒只有沙粒大小。

这些颗粒会通过导管进入为肌瘤供血的小动脉。微粒会堵塞这些动脉，阻塞血液，使肌瘤缩小。子宫其他部位的血液将继续流动。

手术后，IR 医生会拔出导管。他们会使用小型闭合装置来止住插入部位的任何出血。然后，医疗团队的一名成员会清洁插入部位。他们会用创可贴等小敷料（绷带）覆盖插入部位。

该程序需要约 1 小时。

手术后的预期情况

手术完成之后，您将被带到麻醉复苏室 (PACU)。在 PACU 期间，护士会监测插入部位是否出血。如果感觉敷料潮湿或发热，请告

诉护士。

护士还会观察您术后的感觉。如果您感到疼痛，他们会通过静脉注射止痛药。大多数人在手术后 6 到 12 小时会出现严重（非常剧烈）的痉挛。

您将在 PACU 留观 1 到 4 个小时，然后与负责照护工作的同伴一起出院回家。您必须排尿才能离开。

IR 医生会将处方寄到您的药房。处方包括：

- 止痛药
- 止呕药（让您不再感觉想吐的药物）。
- 消炎药（减轻疼痛、发烧和肿胀的药物）

回家后按处方服用止痛药。疼痛通常会在手术后的头几天好转。在 4 到 5 天内，大多数人每天只需服用 1 到 2 次止痛药。

大多数人在手术后 1 到 2 周就会感觉恢复正常。

术后 2 周左右，您将与 IR 医生进行随访预约。

子宫肌瘤栓塞术 (UFE) 术后居家期间应完成的事项

- 您可以在手术后第二天取下敷料。
- 术后 24 小时（1 天）内请勿淋浴或盆浴。之后您可以照常进行淋浴或盆浴。
- 术后 3 天内请勿举起超过 10 磅（4.5 千克）的重物。

- 术后 2 周内请勿运动。
- 如果您在工作中需要搬运重物或进行重体力活动，术后一周内请勿工作。
 - 某些工作可以在手术后第二天回去上班。如果您坐在办公桌前或在工作中无需进行大量体力活动，就可以这样做。
- 服药时请遵照 IR 医生的指示。
- 手术后几天内，您可能会观察到尿液中带有一些血迹。这属于正常现象，并会随着时间推移而消失。

何时致电您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 发热达 100.4°F (38 °C) 或更高。
- 疼痛、恶心（感觉要呕吐）或呕吐不止。
- 疼痛、恶心或呕吐比手术前更严重。
- 置管部位周围发红、肿胀或出血。
- 出现任何让您担忧的症状。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Uterine Fibroid Embolization (UFE) - Last updated on March 31, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利