Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

# 关于 Xofigo® 治疗

本信息将帮助您为即将在 MSK 进行的 Xofigo 治疗做好准备。

## 关于 Xofigo

Xofigo 是一种放射性靶向治疗药物。 该药物用于治疗已扩散至骨骼的前列腺癌。 它有助于预防癌症引起的骨骼相关症状。

Xofigo 主要由以下 2 个部分组成：

- 肿瘤靶向部分可使药物仅对抗肿瘤细胞，而非健康细胞。 这将有助于防止药物损害身体的健康部位。
- 放射性部分则利用辐射（能量波）损伤并杀死肿瘤细胞。

您将通过静脉 (IV) 输液（注射）进行 Xofigo 给药。 即通过静脉注射导管将药物注入到静脉内。

## 为 Xofigo 治疗做好准备

在进行 Xofigo 治疗之前，您将接受分子成像和治疗服务 (MITS) 医疗保健提供者的会诊。 MITS 有时称为核医学服务。 预约就诊前，您可能需要接受血液检查。 如果需要的话，MITS 工作人员将为您提供更多信息。

在预约就诊期间，您的 MITS 提供者将审查您的病史。 请告知对方

您当前正在使用的药物。 包括贴片、药膏、处方药和非处方药。 此外，他们还会与您讨论 Xofigo 治疗的目标。 医疗保健提供者将根据您的病史和血液检查结果，判断 Xofigo 治疗是否适合您。

MITS 医疗保健提供者将决定您开始接受治疗是否安全。 如果安全，他们会详细说明副作用。 他们还会向您提供关于 Xofigo 治疗计划安排的信息。

在 Xofigo 治疗前和治疗期间，您可能需要停止其他前列腺癌治疗。 包括化疗、放疗或另一种放射性靶向治疗。 如果出现该情况，您的医疗保健提供者将为您提供更多相关信息。

## Xofigo 治疗计划安排

以下时间表展示了您的 Xofigo 治疗计划安排。





图 1. Xofigo 治疗计划安排

您将分别接受 6 次 Xofigo 输液。 输液间隔为 4 周。 您的末次 Xofigo 输液将在首次输注后 20 周（约 4.5 个月）进行。 您将前往 MSK 接受每次输液。

您还需要在每次输液前 2-3 天接受血液检查。 您可以在离您最近

的 MSK 办公点接受这些血液检查。

# 关于 Xofigo® 输液就诊

## 前往何处

Schwartz 癌症研究大楼
第一大道 1250 号（东 67 大街和东 68 大街之间）
纽约，邮编 NY 10065

您的 Xofigo 输液就诊将在 MITS 治疗室进行。 前往治疗室：

- 从第一大道 1250 号的入口进入医院。
- 随后在大堂的安保服务台旁边左转。 如果您有疑问或需要乘电梯而不是走楼梯，请向保安寻求帮助。
- 上楼梯，并在楼梯顶端的接待处办理登记手续。 您可以在等候区等待。

随后工作人员将过来带您到 MITS 治疗室。

## 抵达医院后的预期情况

许多工作人员会要求您说出并拼写出您的姓名和出生日期。 这是为了保障您的安全。 因为姓名相同或相似的患者可能会与您同一天接受手术。

到了预约就诊时间，工作人员会带您前往 MITS 治疗室。

## 辐射安全措施

Xofigo 输液后，您的身体会具有辐射性。 在您完成输液预约就诊后离开前，辐射安全工作人员将告知您辐射安全注意事项。 他们

还将为您提供一份需要在家中遵循的书面指南。

为避免他人受到辐射，请遵守以下辐射安全说明。 每次输注 Xofigo 后，您必须在 **1 周内**遵守这些注意事项。

- 如厕时保持坐姿。 请勿使用小便池。
- 如厕后请冲厕所，并用肥皂和水冲洗干净双手。
- 如果您的床单或衣服被血液、尿液或粪便污染，请将其与其他衣服分开清洗。 冲洗干净。
- 在处理沾有污渍的衣物和擦拭血迹、尿液、粪便和呕吐物时，请佩戴医用手套。

注射 Xofigo 后与他人接触是安全的，包括孕妇和儿童。 您可以与他们共度时光，拥抱并触摸他们。

某些安全设备（如机场内或隧道外的设备）可以检测到非常少量的辐射。 您会收到一张卡片，上面写着您已注射放射性药物。 该卡将显示，您在治疗后最长约 **1 个月**的时间内可能会释放少量放射物。 如果您在检查站被执法人员拦住，请出示这张卡片。

**如果您对辐射安全有任何疑问，请在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 致电** 212-639-7391 **联系我们。**

## Xofigo 输液预约就诊后

请遵循辐射安全说明。 在卫生间清洁或冲洗体液（如尿液）时，请务必遵守这些说明。

请在每次注射后饮用大量液体。 这将有助于辐射更快排出您的身

体。

**在 Xofigo 治疗期间（从首次输注至末次输注后 6 个月），请遵守这些安全说明。**



- 每次进行性生活时请使用避孕措施。
- 请勿使您的伴侣怀孕。
- 请勿让您的伴侣接触到您的精液。

如果您有任何问题，请咨询您的 MITS 医疗保健提供者。

## 何时致电您的医疗团队

在输液后的 48 小时（2 天）内观察插入部位。 输注部位是指静脉注射导管进入身体的位置。

如果您发现该部位有任何变化，请致电您的医疗团队，例如：

- 疼痛或烧灼感。
- 发红或其他皮肤颜色变化。
- 肿胀。
- 破损皮肤。
- 水泡或液体渗出。
- 麻木、刺痛或其他感觉变化。

- 皮肤发热或发烫。

## 联系方式

如果您有任何问题或担忧，请致电分子成像和治疗服务。

- 周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，请致电 212-639-3146。 然后请分子成像和治疗服务护士接听电话。
- 下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000。 然后请分子成像和治疗服务值班专科进修医生接听电话。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

About Your Xofigo® Treatment - Last updated on December 11, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利