



患者及照护者教育

无脾患者的疫苗记录

本信息将帮助您了解在脾脏被切除或功能减弱时所需接种的疫苗。

您收到本资源是因为您：

- 已经或将要切除全部或部分脾脏。这称为脾切除术。
- 曾接受过放射治疗导致脾脏功能减弱，抗感染能力也低于正常水平。这称为功能性无脾。

脾脏是人体免疫系统的重要组成部分。没有脾脏或脾脏功能减弱，则发生细菌感染的几率会更高。您可以通过接种推荐的疫苗来预防这类感染。

疫苗与手术

- 如果您知道自己要做手术，请在手术前至少 14 天接种疫苗。
- 如果您接受的是计划外手术，您必须在手术后等待至少 14 天才能开始接种疫苗。

疫苗种类

您将需要接种多种疫苗。医疗保健提供者将告知您应该接种哪些疫苗。所有疫苗均以肌肉注射的方式给药。

- **B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 结合疫苗。** 该疫苗有助于预防 Hib 疾病。Hib 疾病可能引发脑膜炎（脑部和脊髓肿胀）、肺炎（导致肺部积液的炎症）和其他严重疾病。这类疾病可导致残障或死亡。
- **肺炎球菌疫苗。** 该疫苗有助于预防肺炎球菌感染。肺炎球菌可引起肺炎、脑膜炎和其他可导致死亡的严重疾病。
- **脑膜炎球菌疫苗。** 该疫苗有助于预防脑膜炎。为了提供更广泛的保护，有三种脑膜炎球菌疫苗可供选择：Penmenvy®、Menveo® 和 Bexsero®。

- 如果您刚开始接种脑膜炎球菌疫苗，最好是接种 Penmeny。单独接种该款疫苗，即可预防 Menveo 和 Bexsero 所预防的所有脑膜炎球菌类型。
- 如果您尚未开始接种脑膜炎球菌疫苗，则应接种 2 剂 Penmeny，间隔 6 个月。如果接种后仍有感染风险，您将接种 Menveo 和 Bexsero 作为加强剂。
- 如果您已经开始接种 Menveo 和 Bexsero 脑膜炎球菌疫苗，则应继续接种。
 - Menveo 分 2 次接种，间隔 12 周。每 5 年进行一次加强接种。
 - Bexsero 分 2 次接种，间隔 6 个月。如果您在 6 个月前接种了第二剂，则应在接种第二剂后至少 4 个月接种第三剂。1 年后再注射一次加强剂，然后根据需要每 2 至 3 年接种一次。
- 灭活流感疫苗。该疫苗有助于预防流感。
 - 应每年接种流感疫苗。通常是在初秋时接种。
 - 您可以在接种其他疫苗的同时接种流感疫苗。

疫苗记录

这些疫苗不能同时接种。因此要分成几轮接种。医疗保健提供者将帮助您决定接种哪些疫苗以及接种时间。如果您已经接种过此类疫苗，请告知医疗保健提供者。

前往您的初级医疗保健提供者处就诊时，请携带本记录，以便您的疫苗接种保持最新状态。

大多数人都可以在 MSK 接种第一轮疫苗。之后，您可以在初级医疗保健提供者处接种其余疫苗。如果您的初级医疗保健提供者有任何问题，他们可以致电您在 MSK 的医疗保健提供者。

疫苗	接种日期	加强针到期日期	复种日期
B 型流感嗜血杆菌结合疫苗		无	无
20 价肺炎球菌结合疫苗 (PCV20)		无	无
脑膜炎球菌疫苗 (Penmeny)		第 1 剂后 6 个月： _____	如果接种完 Penmeny 疫苗后仍有风险，您将接种 Menveo 和 Bexsero 疫苗。

脑膜炎球菌疫苗 (Menveo)		接种第 1 剂后 12 周： _____	每 5 年一次。
脑膜炎球菌疫苗 (Bexsero)		第 1 剂后 6 个月： _____ 如果您在 6 个月前接种 了第 2 剂，则在接种第 2 剂后 4 个月： _____	1 年后，然后根据需要每 2 至 3 年接种一次。
流感疫苗		无	每年。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Asplenia Vaccine Record - Last updated on December 16, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利