



患者及照护者教育

肠道准备快速指南：使用 MR-Linac 机器进行前列腺癌 MSK Precise[®] 放射治疗

本指南旨在为您提供接受前列腺癌 MSK Precise 放射治疗前和治疗期间的肠道准备快速指南。请阅读关于使用 MR-Linac 机器进行前列腺癌 MSK Precise[®] 放射治疗 (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/about-msk-precise-radiation-therapy-for-prostate-cancer-on-mr-linac-machine)，了解完整说明。

模拟治疗前 3 天

- 开始在早餐和晚餐后各服用 2 片（125 毫克）二甲基硅油 (Gas-X) 片剂。每天服用。
- 开始在晚上服用 1 片（5 毫克）比沙可啶 (Dulcolax) 片剂。每晚服用。

护士会在模拟治疗预约期间为您注射生理盐水灌肠剂。

在医疗团队为您制定治疗计划时，您可以在模拟治疗后停止服用二甲基硅油和比沙可啶片剂。

第一次放射治疗前 3 天

- 重新开始每天在早餐和晚餐后各服用 2 片（125 毫克）二甲基

硅油 (Gas-X) 片剂。

- 重新开始每晚服用 1 片（5 毫克）比沙可啶 (Dulcolax) 片剂。

每天坚持服用二甲基硅油 (Gas-X) 和比沙可啶 (Dulcolax)，直至完成放射治疗。如果您的医疗团队为您提供了其他指导说明，请遵循其说明。

放射治疗期间

尽量在每次放射治疗预约前 1 小时内完成排便。例如，如果您的预约时间是上午 9 点，请尽量在上午 8 点到您离开就诊地点之间排便。如果您前往预约的时间超过 1 小时，请咨询您的医疗团队该怎么做。

如果您在预约就诊前 1 到 2 小时内没有排便，放射科护士会在您就诊时给您进行生理盐水灌肠。

如果开始出现腹泻，请告知您的医疗团队。我们可以帮您调整比沙可啶的剂量。

如果您遵守了上述说明，但在每次治疗前仍无法排便，请告知您的医疗团队。我们可以调整您的肠道准备，找到更适合您的方法。

有用提醒

减少胀气和腹胀：

- 慢慢进食，充分咀嚼食物，避免使用吸管或用瓶子和罐子喝水。这将有助于避免吞咽空气。

- 避免饮用苏打水、汽水和啤酒等碳酸饮料。
- 限制摄入消化时会产生气体的食物和饮料。示例包括西兰花、球芽甘蓝、卷心菜、花椰菜、羽衣甘蓝、洋葱、大蒜、干果，以及牛奶和乳制品（如果您有乳糖不耐症）。请阅读[关于使用 MR-Linac 机器进行前列腺癌 MSK Precise® 放射治疗 \(www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/about-msk-precise-radiation-therapy-for-prostate-cancer-on-mr-linac-machine\)](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/about-msk-precise-radiation-therapy-for-prostate-cancer-on-mr-linac-machine)中的“减少腹胀的饮食指南”部分，了解完整的清单。
- 选择熟制蔬菜，而非生的蔬菜。

为帮助充盈膀胱：

- 保持充足的水分非常重要。大多数人在接受模拟和放射治疗时，膀胱都需要保持充盈。
- 我们建议您在就诊前每天喝大约 64 盎司（8 杯）的水，除非其他医疗保健提供者告诉您要限制饮水量。
- 放射治疗师会在模拟治疗预约期间为您提供更多指导。

联系方式

如果您有问题或担忧，请联系您的放射治疗团队成员。您可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点致电以下号码与其联系。

放射肿瘤医生： _____

联系电话： _____

放射肿瘤护士： _____

联系电话： _____

如非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Bowel Prep Quick Guide: MSK Precise® Radiation Therapy for Prostate Cancer on the MR-Linac Machine - Last updated on March 12, 2026
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利