



患者及照护者教育

BRATT 饮食的第 1 阶段

本信息介绍了 BRATT（香蕉、米饭、苹果酱、茶、吐司）第 1 阶段的饮食。

BRATT 饮食旨在缓解您的胃肠道 (GI) 症状，如腹泻（稀便或水样便）或呕吐。根据症状的严重程度，开始在饮食中缓慢添加食物非常重要。

BRATT 饮食限制了您可以食用的食物。关键在于要与临床营养师合作，通过摄取足够的热量、蛋白质和其他营养素来满足您的特定营养需求。

纤维的类型

纤维是一种人体无法消化的碳水化合物。纤维主要分为 2 类：

不溶性纤维。这类纤维可能会快速通过人体，并会加重腹泻。不溶性纤维存在于果蔬外皮、豆类（如豆子和扁豆）、种子和全谷物中。BRATT 饮食不建议食用此类食物。

可溶性纤维。这种纤维可在水中分解，形成凝胶。这种纤维会让粪便（大便）更硬。可溶性纤维存在于燕麦、桃子、香蕉和大米中。BRATT 饮食推荐食用此类食物。

液体摄入

在改变食物种类的同时，大量饮用水、液体和汤也很重要。含电解质的饮料（如运动饮料和透明的营养补充饮料）是不错的选择。大量饮用液体有助于避免脱水（体液流失）。

最好在两餐期间饮用大部分液体，而非在进餐时饮用。这将有助于避免在进餐时过于饱腹。

BRATT 饮食阶段

BRATT 饮食有 2 个阶段。这是关于该饮食的第一阶段。如果进入第 2 阶段，您的临床营养师或医疗团队会在您的饮食中添加更多食物。

食物种类	可以食用
牛奶	<ul style="list-style-type: none">• 米乳• Lactaid®• 豆浆• 杏仁奶• 燕麦奶
蔬菜	<ul style="list-style-type: none">• 去皮烤土豆、煮土豆或土豆泥
水果与果汁	<ul style="list-style-type: none">• 香蕉• 苹果酱• 加水苹果汁

面包和谷物	<ul style="list-style-type: none"> 用白面粉制作的面包和产品（如面粉玉米饼、英式松饼和原味百吉饼） 干的白吐司 纤维含量少于 3 克的谷物（如 Rice Krispies®、Rice Chex® 或 Corn Flakes®）、Cream of Rice® 白意大利面 白米饭与白米粥
蛋白质	<ul style="list-style-type: none"> 熟蛋白或 Egg Beaters® 奶油坚果黄油，如花生、杏仁、腰果黄油等（每天 1 汤匙）
脂肪	<ul style="list-style-type: none"> 黄油（少量） 橄榄油（少量）
饮品	<ul style="list-style-type: none"> 电解质饮料（如 Pedialyte®） 热茶（无咖啡因） 稀释的运动饮料（如 Gatorade®）
汤类	<ul style="list-style-type: none"> 蔬菜清汤或鸡肉汤
其他	<ul style="list-style-type: none"> 适量甜味剂（如糖、Equal®、Sweet-N-Low® 和 Splenda®） 柠檬汁 无糖明胶（如 Jell-O®） 无糖果冻

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

BRATT Diet Phase 1 - Last updated on February 17, 2023

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利