



患者及照护者教育

乳房植入物相关间变性大细胞淋巴瘤 (BIA-ALCL)

本信息回答了有关乳房植入物相关淋巴瘤 (BIA-ALCL) 的一些常见问题。

关于 BIA-ALCL

淋巴瘤是一种影响免疫系统和淋巴结的癌症。如果您置有乳房植入物，可能会有极低风险患上一种罕见类型的淋巴瘤。它被称为乳房植入物相关间变性大细胞淋巴瘤，简称 BIA-ALCL。这种癌症非常罕见。大多数患者均可接受治疗并痊愈。

BIA-ALCL 可生长在植入物周围的皮肤、淋巴结或瘢痕组织中。

您或您的亲朋好友可能置有乳房植入物。如果情况如此，当您决定与医生交流时，了解有关这种疾病的更多信息有助于做好更充分的准备。这是一个很好的起点。

哪些人可能患上 BIA-ALCL?

如果您的乳房植入物为硅胶或生理盐水填充材质，则有可能会患上 BIA-ALCL。这种情况更常出现在乳房植入物为纹理表面而非光滑表面的患者身上。尽管如此，您罹患 BIA-ALCL 的几率仍然较低。

您可以通过查看乳房植入物 ID 卡来了解植入物是纹理表面还是光

滑表面。将会显示植入物制造商的网站，您可以登录网站了解更多信息。您还可以致电医生办公室。

BIA-ALCL 的体征和症状

您必须每天进行乳房检查，以查看植入物是否出现任何问题。

与整形外科医生安排定期的随访预约也很重要。他们可以在预约时检查是否出现任何 BIA-ALCL 的体征。

乳房或乳房植入物的变化可能属于 BIA-ALCL 的体征。您的一个或两个乳房都可能会出现这些变化。

如果出现以下情况，请与您的医疗保健提供者联系：

- 植入物周围有液体。这会导致乳房变大或感觉更紧。这种情况可能在植入物置入手术多年后出现。
- 乳房外观发生变化。您的乳房可能会肿胀、产生肿块感或看起来形状不一样。
- 乳房皮肤或组织出现肿瘤。这是一种较为少见的体征。
- 一侧或两侧腋窝淋巴结肿大。这是一种较为少见的体征。

上述体征不一定意味着您患有 BIA-ALCL。植入物渗漏等其他问题也可能导致这些症状。如果出现上述症状，请与医生预约。

诊断 BIA-ALCL

您可能需要进行成像扫描，以检查植入物周围的疤痕组织和液体。可以是磁共振成像 (MRI)、正电子发射断层扫描 (PET 扫描) 或超

声波。

您的医生也可以用另一种方法检测 BIA-ALCL。他们可以从乳腺组织、植入物周围的疤痕组织或植入物周围的液体中提取样本。再将样本送到实验室。

治疗 BIA-ALCL

大多数患者均可接受治疗并痊愈。

BIA-ALCL 最常见的治疗方法是手术切除植入物及其周围的疤痕组织。这通常是患者唯一需要的治疗方法。

某些患者可能还需要化疗或放疗，但这种情况并不常见。如果您需要移除植入物，并对乳房重建存在疑问，请咨询您的医生。

其他资源

我们对 BIA-ALCL 的了解不多，但研究人员正在努力了解更多信息。如果您想了解更多信息，请拨打整形与修复外科服务咨询热线 212-639-5220。您也可以访问提供 BIA-ALCL 最新信息的网站：

美国食品药品监督管理局 (FDA)

bit.ly/2W21lLU

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)

- Last updated on April 3, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利