

患者及照护者教育

儿科干细胞移植过程中的常用药物

本信息列出了儿科干细胞移植前、移植期间或移植后的常用药物。医疗保健提供者将与您讨论当前应服用的药物，包括药物名称和需要服药的原因。在本资源中，“您”指您或您的孩子。

补充剂

- 叶酸：人体产生正常血细胞所需的一种维生素。
- 氯化钾/磷钾：一种钾补充剂。人体肌肉（包括心脏）正常工作需要钾。
- 氧化镁/大豆镁：镁补充剂。心脏需要镁才能正常运作。
- 多种维生素：一种维生素补充剂，可能含铁。
- 维生素 K：人体需要的一种维生素，以便血液凝固。

预防 GVHD

以下药物可用于预防或治疗移植物抗宿主病 (GVHD)。包括：

- 霉酚酸酯 (CellCept®)
- 环孢霉素 (Neoral®)
- 他克莫司 (Prograf®)
- 西罗莫司 (Rapamune®)
- 甲氨蝶呤（低剂量）

抗病毒药物

以下药物可用于预防或治疗病毒感染（如水痘和带状疱疹）。移植期间有时会出现的其他病毒感染，包括巨细胞病毒 (CMV)、人类疱疹病毒 (HHV6)、腺病毒和 BK 病毒。包括：

- 阿昔洛韦 (Zovirax®)
- 膦甲酸 (Foscavir®)
- 更昔洛韦 (Cytovene®)
- 西多福韦 (Vistide®)
- 来特莫韦 (Prevymis®)
- 缙更昔洛韦 (Valcyte®)

抗真菌药物

以下药物可用于预防或治疗真菌感染。包括：

- 氟康唑 (Diflucan®)
- 两性霉素 (AmBisome®)
- 伏立康唑 (Vfend®)
- 米卡芬净 (Mycamine®)
- 泊沙康唑 (Noxafil®)
- 艾沙康唑 (Cresemba®)

抗恶心药物

以下药物可用于预防或治疗恶心（想要呕吐的感觉）和呕吐症状。包括：

- 昂丹司琼 (Zofran®)
- 羟嗪 (Vistaril®)
- 甲氧氯普胺 (Reglan®)
- 格拉司琼 (Kytril®)
- 劳拉西泮 (Ativan®)
- 屈大麻酚 (Marinol®)
- 福瑞普坦 (Emend®)
- 苯海拉明 (Benadryl®)

抗酸药物

以下药物可用于减少胃酸分泌。包括：

- 泮托拉唑 (Protonix®)
- 兰索拉唑 (Prevacid®)
- 雷尼替丁 (Zantac®)
- 奥美拉唑 (Prilosec®)
- 艾索美拉唑镁 (Nexium®)

止痛药

以下药物可用于管理疼痛和不适。您可以口服（通过口腔）、静脉注射（通过静脉）或经皮（使用皮肤贴片）来给药。还可以通过一种名为“患者自控镇痛 (PCA)”的特殊止痛泵来接受止痛药。通过 PCA，您可以自行施用安全可控剂量的药物。止痛药的示例包括：

- 阿片类药物，如吗啡 (DepoDur®、Duramorph、MS Contin®)、氢吗啡酮 (Dilaudid®) 或芬太尼 (Duragesic®、Subsys®)
- 非甾体抗炎药，如对乙酰氨基酚 (Tylenol®)

激素（女性）

当血小板计数较低时，以下药物可用于预防阴道出血。包括：

- 炔诺孕酮 (Ovral®)
- 炔诺孕酮和炔雌醇 (Lo-Ovral®)
- 醋酸甲羟孕酮 (Provera®)
- 亮丙瑞林 (Lupron®)
- 醋酸甲羟孕酮 (Depo-Provera®)

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Commonly Used Medicine During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on November 27, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center