



患者及照护者教育

注射地加瑞克 (Firmagon®) 后如何护理 注射部位

本信息介绍了注射地加瑞克后如何护理注射部位。注射部位是指针头进入皮肤的位置。

关于地加瑞克注射

地加瑞克是一种用于治疗前列腺癌的药物。医疗保健提供者会将其注射到您腹部（肚皮）的脂肪部位。

护理注射部位

- 保持注射部位清洁。
- 请穿着宽松的衣物。
- 请勿揉搓或抓挠注射部位。
- 淋浴、沐浴、游泳或弄湿注射部位都是安全的。

注射部位会有一个小肿块。您可以用绷带包扎。但不包扎也没关系。

注射部位可能会有些发红、疼痛和不适。这些症状几天后会消失。如果出现这种情况，可以在清醒时根据需要在注射部位冷敷、敷冰块或敷冰袋。注射后每小时敷 20 分钟，最多持续 24 小时（1 天）。

注射部位反应的症状

有些人会在注射部位出现轻度（不严重）至中度（稍微严重）反应。这类情况通常是暂时性的（持续时间较短）。

症状包括肿胀及超过不适程度的疼痛。

何时致电您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 注射部位反应的症状在 3 天内没有消失。
- 注射部位感到疼痛。请询问您的医疗保健提供者是否可以使用非处方止痛药。对乙酰氨基酚 (Tylenol®) 和布洛芬 (Advil®, Motrin®) 均为非处方止痛药。这类药物无需开具处方。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How To Care For Your Injection Site After a Degarelix (Firmagon®) Injection - Last updated on December 9, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利