Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

如何使用氟尿嘧啶 (5-FU) 眼药水

本信息介绍了如何使用氟尿嘧啶眼药水。 氟尿嘧啶眼药水通常被称为 5-FU 眼药水。

关于 5-FU 眼药水

5-FU 眼药水是一种化疗药物，用于治疗肿瘤。 肿瘤是指眼睛中的异常（非正常）细胞。 5-FU 眼药水还可用于治疗眼睛周围的疤痕组织。

医疗保健提供者会给您开具 5-FU 眼药水和红霉素软膏。 此软膏可以保护皮肤不受 5-FU 眼药水的伤害，对眼睛也很安全。

有些人会对红霉素软膏过敏。 如过敏，医疗保健提供者将开具 TobraDex®（妥布霉素和地塞米松混合物）软膏替代。

您可以在以下地点取药：

洛克菲勒门诊（53 大街）

东 53 大街 160 号， 3 楼药房
纽约，邮编 NY 10022
周一至周五，上午 9:00 至下午 5:45。
646-888-0731

5-FU 眼药水的使用步骤

1. 清洁双手。 使用软膏前，确保其处于干燥状态。
2. 在接受治疗的眼睛下方皮肤上涂一层薄薄的软膏（见图 1）。 避免进入眼内。
3. 在患眼滴入一滴 5-FU 眼药水。
4. 用干净的纸巾擦去多余的眼药水。 然后把纸巾扔掉。
5. 再次清洁双手。




图 1. 软膏涂抹位置

每天使用 4 次 5-FU 眼药水和红霉素或 TobraDex。 尽量间隔均匀。 例如，可以在早餐、午餐、晚餐和临睡前使用。

每天结束时，扔掉用过的旧 5-FU 眼药水瓶。 每天使用一瓶新的，连续使用 7 天。

5-FU 眼药水的副作用

使用 5-FU 眼药水后，您的眼睛可能会感到刺激（如发红、发痒或灼热）或干涩。 如果出现这种情况，可使用非处方润滑（润湿）

眼药水，如 Refresh®、Genteal® 或 Systane®。 购买时无需开具处方。

将 5-FU 眼药水滴入眼睛 10 分钟后再使用润滑眼药水。 如果过早滴入润滑眼药水，5-FU 眼药水的药效就会减弱。

何时致电您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 眼睛周围出现皮疹。
- 眼睛出现剧烈疼痛或烧灼感。
- 视力模糊。

如果出现以下情况，请前往最近的急诊室就诊：

- 呼吸困难。
- 眼睛周围严重肿胀。
- 视力发生严重变化。
- 感觉心跳很快。 但这种情况比较少见。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How To Use Fluorouracil (5-FU) Eyedrops - Last updated on January 9, 2026
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利