



患者及照护者教育

如何使用氟尿嘧啶 (5-FU) 眼药水

本信息介绍了如何使用氟尿嘧啶眼药水。氟尿嘧啶眼药水通常被称为 5-FU 眼药水。

关于 5-FU 眼药水

5-FU 眼药水是一种化疗药物，用于治疗肿瘤。肿瘤是指眼睛中的异常（非正常）细胞。5-FU 眼药水还可用于治疗眼睛周围的疤痕组织。

医疗保健提供者会给您开具 5-FU 眼药水和红霉素软膏。此软膏可以保护皮肤不受 5-FU 眼药水的伤害，对眼睛也很安全。

有些人会对红霉素软膏过敏。如过敏，医疗保健提供者将开具 TobraDex[®]（妥布霉素和地塞米松混合物）软膏替代。

您可以在以下地点取药：

洛克菲勒门诊（53 大街）

东 53 大街 160 号，3 楼药房

纽约，邮编 NY 10022

周一至周五，上午 9:00 至下午 5:45。

646-888-0731

5-FU 眼药水的使用步骤

1. 清洁双手。使用软膏前，确保其处于干燥状态。
2. 在接受治疗的眼睛下方皮肤上涂一层薄薄的软膏（见图 1）。避免进入眼内。
3. 在患眼滴入一滴 5-FU 眼药水。
4. 用干净的纸巾擦去多余的眼药水。然后把纸巾扔掉。
5. 再次清洁双手。




图 1. 软膏涂抹位置

每天使用 4 次 5-FU 眼药水和红霉素或 TobraDex。尽量间隔均匀。例如，可以在早餐、午餐、晚餐和临睡前使用。

每天结束时，扔掉用过的旧 5-FU 眼药水瓶。每天使用一瓶新的，连续使用 7 天。

5-FU 眼药水的副作用

使用 5-FU 眼药水后，您的眼睛可能会感到刺激（如发红、发痒或灼热）或干涩。如果出现这种情况，可使用非处方润滑（润湿）

眼药水，如 Refresh®、Gentleal® 或 Systane®。购买时无需开具处方。

将 5-FU 眼药水滴入眼睛 10 分钟后再使用润滑眼药水。如果过早滴入润滑眼药水，5-FU 眼药水的药效就会减弱。

何时致电您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 眼睛周围出现皮疹。
- 眼睛出现剧烈疼痛或烧灼感。
- 视力模糊。

如果出现以下情况，请前往最近的急诊室就诊：

- 呼吸困难。
- 眼睛周围严重肿胀。
- 视力发生严重变化。
- 感觉心跳很快。但这种情况比较少见。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How To Use Fluorouracil (5-FU) Eyedrops - Last updated on January 9, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利