



## 患者及照护者教育

# 关于输血前用药的重要信息

本信息介绍了 MSK 预防输血反应的用药指南。这类药物应在输血前使用。

MSK 遵循最安全的方式制备和储存血液制品。这有助于防止您发生输血反应。

在输血或输注血小板之前，您可能需要服用药物。所有药物都可能产生副作用。

MSK 遵循的指南告知我们您是否需要在输血前服用药物。许多其他癌症中心也采用类似的指导原则。

**输血后无反应：**如果您没有输血反应，则我们不会对您用药。

**输血期间发烧：**输血期间您可能会不止一次发烧。我们是否给您用药取决于发烧的成因，是输血还是其他原因。

**荨麻疹或瘙痒：**由于输血，您可能会不止一次出现荨麻疹或瘙痒。我们可能会在以后输血前给您服用苯海拉明 (Benadryl<sup>®</sup>)。

**严重反应：**您可能对输血产生了严重反应，如呼吸困难。以后输血前，我们可能会给您服用以下一种或多种药物：

- 苯海拉明 (Benadryl<sup>®</sup>)
- 类固醇
- 抗酸剂

如果您有任何疑问，请致电您的医疗保健提供者。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源, 请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe), 在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Important Information About Medications Before a Transfusion - Last updated on March 1, 2023  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利