



患者及照护者教育

关于输血前用药的重要信息

本信息介绍了 MSK 预防输血反应的用药指南。这类药物应在输血前使用。

MSK 遵循最安全的方式制备和储存血液制品。这有助于防止您发生输血反应。

在输血或输注血小板之前，您可能需要服用药物。所有药物都可能产生副作用。

MSK 遵循的指南告知我们您是否需要在输血前服用药物。许多其他癌症中心也采用类似的指导原则。

输血后无反应：如果您没有输血反应，则我们不会对您用药。

输血期间发烧：输血期间您可能会不止一次发烧。我们是否给您用药取决于发烧的成因，是输血还是其他原因。

荨麻疹或瘙痒：由于输血，您可能会不止一次出现荨麻疹或瘙痒。我们可能会在以后输血前给您服用苯海拉明 (Benadryl®)。

严重反应：您可能对输血产生了严重反应，如呼吸困难。以后输血前，我们可能会给您服用以下一种或多种药物：

- 苯海拉明 (Benadryl®)

- 类固醇
- 抗酸剂

如果您有任何疑问，请致电您的医疗保健提供者。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Important Information About Medications Before a Transfusion - Last updated on June 24, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利