



患者及看护者教育

# 手术前指导说明

您的手术计划时间为：\_\_\_\_\_

手术期间，会对您进行麻醉（使用药物使您入睡）。因此遵循这些指导说明非常重要。如果您在邻近手术前服用了错误的药物或进食或饮水，将会导致手术推迟或取消。

请与您的医疗保健提供者讨论您正在使用的所有药物，包括处方药和非处方药、贴剂和乳膏。有关术前用药的更多信息，请阅读我们的资源含阿司匹林、其他非甾体抗炎药 (NSAID) 或维生素 E 的常见药物 ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)) 和草药疗法和癌症治疗 ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment))。

## 手术前 7 天，服用\_\_\_\_\_

- 如果您服用阿司匹林或含有阿司匹林的药物，您可能需要调整剂量或停用。阿司匹林可能会导致出血。请遵循医疗保健提供者的指导说明。未得到医疗保健提供者的指示时，请勿随意停用阿司匹林。
- 停止服用维生素 E、复合维生素、草药和其他膳食补充剂 它们可能会导致出血。

## 手术前 2 天，服用\_\_\_\_\_

- 停止使用非甾体抗炎药 (NSAID)，例如布洛芬 (Advil®、Motrin®) 和萘普生 (Aleve®)。这些药物可能会导致出血。

## 手术前 1 天，服用\_\_\_\_\_

- 入院办公室的工作人员将在下午 2:00 至 7:00 之间致电给您。他们会告知您应该何时到医院做手术。如果您的手术安排在星期一，他们会在前一个星期五致电给您。如

果您在晚上 7:00 前未接到电话，请致电 212-639-5014。



手术前一晚午夜后请勿进食。包括硬糖和口香糖。

## 手术当天早晨，服用\_\_\_\_\_

- 如果您的医疗保健提供者向您提供有 ClearFast preop® 饮料，请在计划到达时间前 2 小时饮用。请勿饮用其他任何饮品，包括水。
- 如果您的医疗保健提供者未提供 ClearFast PreOp 饮料，您可以在午夜至计划到达时间前 2 小时期间饮用总计 12 盎司水。请勿饮用其他任何饮品。
- 服用这些药物：

---

---

---

---

- 根据您的医疗保健提供者的指导说明停用服用这些药物：

---

---

---

---



在预定到达时间前 2 小时内，请勿饮用任何饮品。包括 ClearFast 和水。

## 联系信息

如果您对您的用药说明有任何疑问或担忧，请与术前测试 (PST) 团队成员讨论。您可以在周一至周五上午 8:00 至下午 5:00 致电 212-610-0488 联系他们。

下午 5:00 后、周末和节假日，请联系您的医疗保健提供者办公室。如果您不确定联系方式，请致电 212-639-2000。

今天照护您的执业护士 (NP) 是：

---

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

Instructions Before Your Surgery - Last updated on October 30, 2020

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利