



病人和職業教育

# 居家管理 新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)

本信息介绍了如果您在家中并且感染或者疑似感染 COVID-19，您应该怎样处理。

## 关于 COVID-19

COVID-19 是一种病毒性疾病，会影响肺部和呼吸道。COVID-19 的症状可能较轻，也可能较重，包括：

- 发烧（体温超过 100.4 °F 或 38 °C）
- 咳嗽
- 呼吸问题（如呼吸急促或胸闷）
- 身体疼痛
- 发冷
- 疲劳（感觉很累或乏力）
- 味觉或嗅觉丧失
- 头痛
- 腹泻（稀便或水样便）

接触病毒 2 到 14 天后，可能会开始出现这些症状。症状可能持续 1 到 3 周。通常情况下，癌症患者的症状与其他人别无二致。

一些感染 COVID-19 的人可能会没有任何症状（无症状感染者）。即使没有症状，这些感染者仍然可能会把病毒传播给其他人。

许多人在患有病毒性疾病如 COVID-19 后会持续咳嗽数周。只要您的咳嗽症状没有加重

或者逐渐缓解，您就不需要担心。咳嗽时，请用肘部或纸巾遮掩口鼻。如果您的咳嗽症状加重，您的痰（您咳出的粘液）中带血，而您之前没有出现过该症状，或您开始咳出更多的痰液，请致电您的医疗保健提供者。

## 如何控制症状

如果您感染 COVID-19，我们将每天早晨向您的“MyMSK”（MSK 斯隆患者门户网站）账户发送关于您症状的一些问题。这有助于我们了解您的感受。阅读我们的资源 *How to Complete Your COVID-19 Symptom Questionnaire* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/covid-19-symptom-questionnaire](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/covid-19-symptom-questionnaire))，以获取填写该调查问卷的说明。

如果你使用睡眠呼吸暂停设备（如 CPAP 机）或家用喷雾器，请在使用前咨询您的医疗保健服务商。这些设备可能会传播 COVID-19 病毒。

## 药物

- 您可以服用对乙酰氨基酚（泰诺林）来帮助治疗发烧、身体疼痛和头痛。
  - 每天服用的对乙酰氨基酚剂量不应超过 3 g。过量服用有伤肝脏。
  - 对乙酰氨基酚是非处方药和处方药中一种十分常见的成分。请务必阅读所服用药物的说明标签。药品上有时并未完整列出乙酰氨基酚的全称。有关包含对乙酰氨基酚成分的常用药物和对乙酰氨基酚的缩写列表，请参阅我们的资源 [\[\\*\\*bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNTU=\\*\\*\]](#) 中“关于对乙酰氨基酚”一节。
- 非处方感冒药对治疗 COVID-19 没有效果。但是，如果您咳嗽、喉咙痛或鼻塞，它们依旧具有疗效。如果您有高血压，请勿服用解充血药。
- 抗生素对治疗 COVID-19 没有效果。请勿使用抗生素，除非医疗保健服务商建议您这样做。

如果您感染 COVID-19，但没有任何症状，请勿服用任何感冒药或非甾体抗炎药 (NSAID)，如对乙酰氨基酚 (Tylenol®)、布洛芬 (Advil®) 和萘普生 (Aleve®)。这些药物可能会掩盖 COVID-19 的症状。如果您的医疗保健提供者告知您服用小剂量的阿司匹林（每天 81 毫克），那您可以按此服用。如果您认为需要使用更高剂量，请首先咨询一下您的医疗保健提供者。

请记录您的体温。

- 每天测量体温两次，早晚各一次。
  - 如果你正在接受化疗，并出现新的发烧症状，体温超过 100.4°F (38°C)，请致电您的医疗保健服务商。
  - 如果您发烧，体温超过 102 °F (38.9 °C)，发烧症状已经持续 24 小时，且服用对乙酰氨基酚后未见好转，请致电您的医疗保健服务商。

## 饮食

- 确保饮食清淡。例如，少吃多餐，一日六餐而非三餐。这将有助于缓解恶心和食欲不振。
- 每天喝 6 到 8 杯 (8 盎司) 水。水、运动饮料、不含咖啡因的软饮料、果汁、茶和汤都是不错的选择。这将有助于您保持体内的水分，稀释鼻子和肺部的粘液。

## 如何避免 COVID-19 传播

COVID-19 很容易在人与人之间传播。它可以在空气中通过飞沫传播，也可以在病人咳嗽或打喷嚏后留在物体表面。如果有人接触到感染者，然后再触摸自己的眼睛、鼻子或嘴巴，也会发生传播。

请遵循本节中的操作指南，以帮助防止 COVID-19 传播给您的家庭和社区中的人。如果您还没有收到阳性 COVID-19 检测结果，并且还在等待检测结果，如果检测结果为阴性，您可以停止遵循这些操作指南。阳性 COVID-19 检测结果意味着检测显示您已感染 COVID-19。COVID-19 检测阴性意味着检测未显示您感染 COVID-19。

- 如果您感染 COVID-19 并出现症状，请遵守以下操作指南，直至：
  - 在没有使用退烧药物的情况下，您已至少 3 天未出现体温超过 100.4 °F (38 °C) 的发烧症状。这些药物可包括对乙酰氨基酚 (Tylenol®)、布洛芬 (Advil®)、萘普生 (Aleve®)、全剂量阿司匹林（每日超过 81 mg）和吲哚美辛 (Tivorbex®)。
  - 您的呼吸问题已经好转，或者呼吸恢复正常。
  - 在您首次出现阳性检测结果后至少 10 天出现 COVID-19 阴性检测结果，或自从您首次出现 COVID-19 阳性检测结果以来至少已经过去 4 周。
- 如果您感染 COVID-19 但没有症状，请遵守以下操作指南，直至：
  - 在您首次出现阳性检测结果后至少 10 天出现 COVID-19 阴性检测结果，或自从您首次出现 COVID-19 阳性检测结果以来至少过去 4 周（并且您未出现任何症状）。

如果您在首次生病时出现的任何症状发生复发，请立即重新开始遵循这些操作指南，并联系您的医疗保健提供者。

如果您的医疗保健提供者过去曾告诉您服用小剂量的阿司匹林（81 mg/天），这是没有问题的。如果您认为需要使用更高剂量，请首先咨询一下您的医疗保健提供者。

## 除看病以外，请待在家中

- 除获取医疗服务以外，切勿在外面做任何事情。
- 请勿上班、上学或前往公共场所。
- 避免使用公共交通工具、共享出行服务和出租车。
- 如果您需要医疗服务，请先致电您的医疗保健服务商，告知他们您即将前去就医。

- 如果您需要外出，请尽可能佩戴布制面部遮盖物。

## 在家中将自己与其他人隔离开来

- 在家中选择一个房间。打开窗户，让空气流通。尽量待在那个房间里，远离其他人和宠物。
- 使用单独的浴室（如果您有）。
- 清洁您经常触摸的表面，并将其消毒（如电话、遥控器、门把手、浴室用具、厕所、键盘、桌面、柜台、平板电脑和床头柜），至少每天一次。如果表面脏了，请先使用肥皂和清水或家用清洁喷雾剂或抹布进行清洁。然后，使用家用消毒剂。请遵循标签说明。
- 尽量与家中的其他人和宠物保持至少 6 英尺（2 米）的距离。
- 别让任何人来看望您。

如果您需要帮助，请在家中选择一个人作为您的照护者。您的照护者必须身体健康。他们不应该患有任何慢性疾病或出现免疫系统脆弱的情况。您的照护者应该遵循我们资源 *居家管理 2019 冠状病毒病 (COVID-19)：照护者指南* ([www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/managing-covid-19-home-information-caregivers](http://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/managing-covid-19-home-information-caregivers)) 中的说明。

## 佩戴布制面部遮盖物

- 如果您需要靠近其他人或宠物，即使是在家里，也需要配戴布制面部遮盖物（如头巾、围巾或手帕）遮掩口鼻。
- 如果您在配戴布制面部遮盖物时出现呼吸问题或无法自己取下它，请勿继续配戴。
- 如需自制布制口罩，请遵循 <https://bit.ly/3cKkV4a> 上面的 CDC 操作指南。

## 咳嗽和打喷嚏时请捂住口鼻

- 当您咳嗽或打喷嚏时，请用纸巾遮掩口鼻。请将用过的纸巾放入套有垃圾袋的带盖垃圾桶里。
- 咳嗽或打喷嚏后，请立即洗手。
  - 如果您使用肥皂和清水洗手，请湿润您的双手，涂上肥皂。揉搓双手至少 20 秒后

冲洗干净。然后使用一次性毛巾擦干双手，然后用同样的毛巾关闭水龙头。如果您没有一次性毛巾，可以使用干净的布毛巾。毛巾被润湿之后，请更换它们。

- 如果您使用含酒精的洗手液，请务必将它涂满整个手部，不断揉搓，直到双手干燥。

## 避免共用个人家居用品

- 请勿与家中的其他人或宠物共用盘子、水杯、杯子、餐具、毛巾或寝具。
- 用肥皂和清水或洗碗机彻底清洗用过的盘子、水杯、杯子和餐具。
- 将脏衣物放进洗衣袋。切勿抖动脏衣物。使用普通洗衣皂在高温条件下洗涤。将衣物晾干。

## 压力管理建议

对 COVID-19 感到担忧很正常，特别是当您或您的爱人生病时。您可以做点其他事情来照顾好自己，比如：

- 和朋友或爱人打电话或视频聊天。
- 培养新的爱好或完成平时没有时间进行的活动。
- 停止看新闻，休息一下。

MSK 斯隆有许多专业人员、志愿者和支持计划，可以帮助您顺利度过这段时间。更多有关压力调节的信息和提示，请阅读我们的资源

[\*\*\*bXNrLW5vZGUtbGluazogMTkxNzUy\*\*]。

## 何时联系您的医疗保健服务商

如果您出现以下情况，请立即致电医疗保健服务商：

- 休息时呼吸困难。
- 短距离行走时呼吸困难。短距离示例：从一个房间走到另一个房间，大约 25 英尺（7.6 米）。
- 您正在接受化疗，并出现新的发烧症状，体温超过 100.4°F（38°C）。

- 发烧，体温超过 102 °F (38.9 °C) ，症状已持续 24 小时，且服用对乙酰氨基酚后未见好转。
- 您的痰液中带血。
- 胸痛。
- 剧烈头痛。
- 您有疑问或担忧。

有关如果您或您家中有人感染 COVID-19，您该如何处理的的更多信息，请访问[www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick](http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick)。有关 MSK 斯隆如何预防 COVID-19 的最新信息，请访问网站 [www.mskcc.org/coronavirus](http://www.mskcc.org/coronavirus)。

If you have any questions, contact a member of your healthcare team directly. If you're a patient at MSK and you need to reach a provider after 5:00 PM, during the weekend, or on a holiday, call 212-639-2000.

For more resources, visit [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) to search our virtual library.

Managing COVID-19 at Home - Last updated on June 11, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center