



患者及照护者教育

# 脑膜瘤

## 关于脑膜瘤

脑膜瘤是一种发生在脑膜的脑肿瘤。脑膜是包裹大脑和脊髓的组织。

脑膜瘤通常发于颅内，但也可能发于脊柱。大多数脑膜瘤患者仅在一个部位长出一个肿瘤，但也有可能在大脑和脊髓的不同部位同时长出多个肿瘤。

大多数脑膜瘤均为良性（非癌性）。有些脑膜瘤可能是恶性（癌性），但这种情况很少见。即使脑膜瘤并非癌性，也会因其位置而造成严重问题。如果脑膜瘤长得太大，则会影响大脑的工作，如果它们离重要的神经或血管太近，也会造成问题。

脑部或脊髓受过辐射的人罹患脑膜瘤的风险更大。激素变化或基因 (DNA) 构成也可能会增加罹患脑膜瘤的风险。

## 脑膜瘤的症状

大多数脑膜瘤生长缓慢，不会引起任何症状。

如果有症状，也会根据肿瘤的位置而有所不同。这些症状包括：

- 头痛

- 视力改变，如复视或视力丧失
- 听力变化，如耳鸣或听力下降
- 说话发生变化，如难以表达自己的想法
- 手脚麻木或无力
- 平衡或协调困难
- 记忆力减退
- 嗅觉丧失
- 癫痫发作（脑电活动发生变化）
- 性格变化

其他情况也可能会导致上述症状。如果您有任何这些症状，或这类症状发生了变化，请致电您的医生。

## 诊断脑膜瘤

如需诊断脑膜瘤，您需要进行头部成像扫描，如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。

## 脑膜瘤的治疗

脑膜瘤的治疗取决于肿瘤的大小和位置。

如果脑膜瘤生长缓慢，且不会引起任何症状，您可能无需治疗。您可能需要每年进行脑部 MRI，以了解肿瘤是否在生长，如果开始出现任何症状，应告知医生。如果您的脑膜瘤为癌性、导致症状或生长迅速，则可能需要进行手术切除。

有些脑膜瘤因靠近大脑控制重要功能的部位而无法切除。在这种情况下，您可能需要接受放射治疗以阻止其生长。如果您接受了脑膜瘤切除手术，但肿瘤未完全切除，则可能还需要接受放射治疗来阻止肿瘤生长。在极少数情况下，您可能需要接受化疗或其他治疗。

有一些临床试验研究脑膜瘤的不同治疗方法。有关 Memorial Sloan Kettering (MSK) 临床试验的更多信息，请咨询您的医生或访问 [www.mskcc.org/cancer-care/clinical-trials/search](http://www.mskcc.org/cancer-care/clinical-trials/search)。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

Meningioma - Last updated on June 13, 2019

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利