

患者及照护者教育

接受那昔妥单抗 (Danyelza®) 免疫治疗后的出院须知

本信息介绍了如何在接受那昔妥单抗免疫治疗后进行自我照护。在本资源中，“您”指您或您的孩子。

为了治疗神经母细胞瘤或骨肉瘤，您近期接受了那昔妥单抗免疫治疗。神经母细胞瘤是外周神经系统的一种癌症。骨肉瘤则是骨骼癌症的一种。

通常情况下，治疗后的大部分副作用会在治疗后一周内消退。但出院后（离开医院后）仍有可能会出现一些副作用。

常见副作用

疼痛

疼痛是那昔妥单抗免疫治疗最常见的副作用。通常在那昔妥单抗输注期间疼痛感最强烈，但您回家后也可能会感到疼痛。您可能会在不同的时间感受到不同程度的疼痛。

注意事项：

- 出院后，您可能会感到疼痛。在离开医院前，请确保您已拿到我们开具的止痛药。
- 除非获得我们的明确指示，否则不要擅自服用对乙酰氨基酚

(Tylenol[®]) 或布洛芬 (Advil[®] 或 Motrin[®]) 来减轻疼痛。

- 服用此类药物前一定要测量体温。这些药物可能会掩盖发烧症状，任何发烧都应由您的医疗团队进行检查。
- 请严格按照医嘱服用止痛药。如果药物无法缓解您的疼痛，或者遇到了任何副作用，请致电联系我们。副作用包括：
 - 便秘（排便比平时少）。
 - 恶心（感觉想吐）。
 - 疲乏（感觉非常疲倦）。
 - 瘙痒。

下一剂止痛药的派发时间为：上午 | 下午_____。

药品名称：_____

药物剂量：根据需要每隔_____小时服用_____以缓解疼痛。

过敏反应

您可能会出现过敏反应，如皮疹发痒、发红或肿胀。这些反应可能发生在那昔妥单抗治疗之间的任何时间。我们会给您开一些抗过敏药物在家服用，如羟嗪 (Vistaril[®]) 或苯海拉明 (Benadryl[®])。

注意事项：

- 呼吸变化或呼吸短促可能是过敏反应的体征。如果您对自身呼

吸情况有任何担忧，请拨打 911 并寻求紧急护理。

- 我们会给您开具抗过敏药物的处方。离开医院前，请确保已拿到药物。

下一剂抗组胺药的派发时间为：上午 | 下午 _____。

药品名称：_____

药物剂量：根据需要每隔 _____ 小时服用 _____ 以缓解过敏症状。

发热

治疗后您可能会发热。这可能与治疗有关，或者是感染的体征。确保家里有温度计。如果出现以下情况，请务必致电我们获取指导：

- 发热达 100.4 至 100.9°F (38 至 38.2°C) ，且持续时间超过 1 小时。
- 发热 $\geq 101^{\circ}\text{F}$ (38.3 °C) 。

中央静脉导管感染

中央静脉导管又称中央导管，就像一条人工静脉。该药物可以让您的医疗团队更容易通过您的血管进行药物治疗和检查。中央导管会聚集细菌（病菌）并引起感染。您可能会出现导管部位发热、发红、肿胀或压痛的症状。如果您出现以上任何症状，请立即致电联系我们。

您是否置有中央导管，如 MediPort、Broviac™ 或经外周静脉置入中央静脉导管 (PICC)？是 | 否

请参考下方的备注区域以获取更多指导：

如厕困难

您可能会出现便秘（难以排便）或排尿（小便）困难。这是许多止痛药的常见副作用。我们可能会为您开具药物来帮助排尿和排便。

如何应对：

- 将温热的湿布敷在腹部肚脐下方，以帮助排尿。
- 饮用足量液体。
- 按照我们的指导来管理便秘。

恶心和呕吐

您可能会感到恶心并呕吐。我们可能会为您开具药物来帮助您缓解症状。

下一剂抗恶心药物的派发时间为：上午 | 下午_____。

药品名称：_____

药物剂量：根据需要每隔_____小时服用_____以缓解恶心。

何时返回诊所复诊

请于 _____ (日期) 上午 | 下午_____ 返回诊所
进行：

何时致电您的医疗团队

如果出现以下情况，请拨打 911 并寻求紧急护理：

- 呼吸急促。
- 呼吸困难。
- 对呼吸有任何担忧。

如果出现以下情况，请致电您的医疗团队：

- 嘴唇、舌头或喉咙肿胀。

- 发热达 100.4 至 100.9°F (38 至 38.2°C) , 且持续时间超过 1 小时。
- 发热达 101°F (38.3°C) 或更高。
- 皮肤苍白、出汗或发冷。这些都可能属于感染体征。
- 已特定小时数未排尿。医疗团队将告诉您具体时间。
- 已特定天数未排便。医疗团队将告诉您具体时间。
- 服药后疼痛没有缓解或有所恶化。
- 持续感到恶心或呕吐不止。
- 每次摄入液体后都会呕吐。
- 突然头痛且持续不减。
- 视力变化。
- 癫痫发作。
- 观察到自身的情绪、行为或警觉性发生变化。
- 咳嗽不止。
- 中央导管进入身体的部位发红、肿胀或有触痛。

联系方式

如有疑问, 请直接联系您的医疗团队成员。您可以在周一至周五上午 8 点到下午 6 点联系到他们。下午 6 点以后、周末和节假日, 请拨打 212-639-2000 咨询儿科进修医生。

如果您有不需要立即回答的问题, 可以通过 MSK MyChart 向您的医疗团队发送消息。MSK MyChart 是 MSK 的患者门户网站。

关于 MSK 的儿科紧急护理中心 (UCC)

根据您的症状，医疗团队可能会让您前往 MSK 的儿科 UCC 就诊。

儿科 UCC 位于 Memorial Hospital (MSK 的主医院) 的 9 楼。最近的入口位于约克大道 1275 号（东 68 大街）。该入口全天候开通。抵达医院后，请乘 M 电梯到达 9 楼，并在服务台登记。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Discharge Instructions After Your Naxitamab (Danyelza®) Treatment -
Last updated on December 2, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center