

门诊患者双特异性抗体应急指南

	重大紧急情况： 拨打 911	非紧急情况： 请致电您的医生办公室
警觉性	<ul style="list-style-type: none">• 无法醒来• 手脚突然无法动弹• 癫痫发作（出现无法控制的颤抖或僵硬）• 视力发生突然改变	<ul style="list-style-type: none">• 眩晕或头晕现象• 颤抖或摇晃• 情绪变化• 精力水平变化• 新发意识模糊，或意识模糊比平时加剧• 难以找到合适的词语• 警觉水平变化• 麻木或刺痛• 无法四处走动• 吞咽困难
呼吸	<ul style="list-style-type: none">• 无法呼吸• 呼吸困难	<ul style="list-style-type: none">• 喘息（呼吸时发出哨声或吱吱声）• 极少量活动就更容易喘不过气（呼吸短促）• 新发咳嗽或持续咳嗽• 咳血、绿色或黄色粘液（果冻状物质）• 躺下时呼吸困难
发烧/寒战 或感染		<ul style="list-style-type: none">• 经口测量体温时，发热 ≥ 100.4 °F (38 °C)• 颤抖性寒战（体温可能正常）• 感冒症状（流鼻涕、流眼泪、打喷嚏、咳嗽）• 排尿时疼痛或灼热

