



病人和職業教育

姑息性全脑放射治疗

本信息介绍了在姑息性全脑放射治疗的模拟治疗过程中可能发生的情况。还介绍了治疗期间可能发生的情况，以及您可能会出现副作用。

模拟治疗

模拟治疗（也称为定位或计划阶段）是用于规划放射治疗所进行的一个程序。其目的是定位治疗部位，确保您获得正确的放射剂量，并限制附近组织接受的辐射量。

在模拟治疗过程中，我们可能会为您的面部和头部制作一个塑料网格模具（见图 1）。您将在模拟治疗和所有正式治疗过程中使用该模具，以帮助您保持静止，并确保您的头部每次均处于相同位置。戴上模具后，您仍能看到事物并听到声音。模具的制作大约需要 15 分钟。




图 1. 用于全脑放射治疗的模具示例

取下皮肤上的医疗设备

如果您皮肤上佩戴有以下任何设备，制造商建议您在模拟治疗或正式治疗之前将其取下：

- 连续血糖监测仪 (CGM)
- 胰岛素泵

请与您的放射肿瘤医生讨论，模拟治疗或正式治疗前是否需要取下相关医疗设备。模拟治疗或正式治疗结束后，请确保您有一个额外的设备可供佩戴。

如果您不确定如何在设备关闭时管理您的血糖，请在预约前向负责您糖尿病照护的医疗保健提供者进行咨询。

治疗期间

工作人员会带您到放射治疗室。在那里，放射治疗师将等候您，并帮助您躺在治疗床上（见图 2）。您将按照模拟治疗时的方式静躺在正确的位置。然后，您将开始接受治疗。治疗期间，机器会在您周围以圆圈的方式移动。




图 2. 放射治疗设备示例

根据您的治疗计划，您将在治疗室停留 15 至 90 分钟。大部分时间都会用来确定您在治疗床上处于正确的位置。放射治疗师会进出治疗室，但他们能够全程看到您，并听到您的声音。

副作用

治疗期间和治疗后，您可能会出现一些副作用。一些常见副作用如下。

如果您出现任何副作用，请务必告知您的放射治疗团队成员。我们会帮助您管理这些情况。

- **脱发**：治疗后约 2-3 周，您的头发和眉毛可能会出现脱落。治疗结束后 3-6 个月，这些毛发会重新长出。

- **皮肤反应**：治疗后约 2-3 周，您的皮肤可能会变成粉色或古铜色。继续治疗时，可能会变成鲜红色，也可能变得非常暗。您可能还会感觉干燥和瘙痒，并干裂起皮。您可以使用针对干燥皮肤的乳液（如 Eucerin®）帮助保持皮肤湿润。通过涂抹防晒霜来保护皮肤免受阳光照射也会有所帮助。这些皮肤反应将在治疗结束后约 3 或 4 周开始逐渐好转。
- **疲乏**：疲乏是感觉疲倦或虚弱、不想做事、注意力无法集中，或反应不再灵敏的一种症状。疲乏的程度可轻可重。您可能在治疗后约 2-3 周出现疲乏，且可能会在治疗结束后持续 6 周至 1 年。

模拟治疗日期： _____

治疗开始日期： _____

用药指导： _____

For more resources, visit www.mskcc.org/pe to search our virtual library.

Palliative Whole Brain Radiation Therapy - Last updated on September 28, 2021

All rights owned and reserved by Memorial Sloan Kettering Cancer Center