Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

关于阴茎植入物

本信息介绍了阴茎植入物，包括其优点、风险和可能的并发症。 在决定是否要植入阴茎植入物之前，请仔细阅读本信息。 如果您有任何问题，请咨询您的医疗保健提供者。

阴茎植入物

阴茎植入物是一种放置在阴茎内的可膨胀装置。 可以帮助勃起（性生活时变硬）。 阴茎植入物用于治疗阳痿（无法勃起或无法保持勃起）， 也被称为勃起功能障碍 (ED)。

阴茎植入物通过手术完全植入体内。 要使用阴茎植入物，需要按压位于阴囊内的泵。 阴囊会向阴茎内的植入物输送液体。 使阴茎变得足够硬，可以进行性生活。 结束后，可以对植入物进行放液。 您的医疗保健提供者将在咨询期间为您提供更多信息。 手术后，会安排您参加阴茎植入物的使用培训课程。

如果符合以下情况，可以考虑植入阴茎植入物：

- 您尝试过其他 ED 治疗方法，但没有效果。 其他治疗方法包括服药、注射和使用真空装置。
- 您尝试过其他治疗方法，但感觉有副作用。

阴茎植入物不会增加阴茎的长度和周长（一圈的长度）。

阴茎植入物的优点

- 阴茎植入物可以使您的阴茎变硬，类似于自然勃起。
- 您不需要服用药物就能起作用。

阴茎植入物的风险

- 植入物必须通过手术植入。 每种手术都有一定的风险。 您的医疗保健提供者会与您讨论这种手术的风险。
- 阴茎植入物手术不可逆。 这意味着当您不再需要阴茎植入物时，无法将其取出。 其他 ED 治疗方法对您无效。

可能的并发症

虽然阴茎植入物术后并发症很少见，但也有可能发生。 一些并发症更有可能在手术后立即发生，包括：

- 阴囊血肿。
  - 即阴囊、下腹部和大腿内侧出现肿胀和淤血。
  - 术后最初几周内，阴囊血肿的风险会增加
  - 您的医疗保健提供者会指导您如何预防阴囊血肿。 您也会在手术后穿上特殊的内裤。
- 感染
  - 术后 1 年内都可能发生感染，但术后前 8 周内感染的风险会增加。

- 如果您是第二次接受阴茎植入物手术，感染的可能性会更大。
- 如果植入物受到感染，需要将其取出并更换。 如果需要静脉 (IV) 注射抗生素来清除感染，您可能需要住院。

在手术后数月或数年，您可能会遇到一些问题，例如：

- 植入物停止工作。 如果发生这种情况，需要进行修复或更换。
- 随着时间的推移，植入物可能会磨损。 如果发生这种情况，需要再做一次手术。 您的外科医生将决定是修复还是更换植入物。
- 您的植入物自动膨胀。 如果遇到自动膨胀的情况，请告知您的医疗团队。
- 其他不太常见的并发症包括：
  - 侵蚀，即植入物穿过皮肤。 如果出现感染，这种情况更有可能发生。 如果发生这种情况，需要取出植入物。
  - 移位，即植入物移出原位。 如果发生这种情况，可能需要再做一次手术。

您的医疗团队将在咨询期间与您讨论所有风险、优点和可能的并发症。

手术后可能发生的情况

- 大多数人在术后几小时即可出院。 一些人可能需要在医院过夜。 您的医疗保健提供者会告知您何时可以出院。

- 手术后 6 周内不能进行手淫或任何性生活。 包括阴道性行为、口交和肛交。
- 我们建议您至少请假 7 天来进行术后恢复。
- 手术后约两周内，您可能会出现疼痛和肿胀。
- 您的阴茎可能需要 6 个月以上才能恢复正常。
- 射精或性高潮的质量不应有任何变化。

随访

- 您将在手术 2 周后接受随访，以评估进展情况。 我们会为您安排。
- 手术 6 周后，您将再次接受随访，学习如何使用阴茎植入物。

如果您在手术后有任何问题或顾虑，请致电您的医疗团队。

> 如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利