

患者及照护者教育

## 光动力疗法

本信息将有助于您为光动力疗法 (PDT) 做好准备。

### 关于光动力疗法

光动力疗法 (PDT) 是一种治疗光线性角化病 (皮肤病变) 的方法。病变是指与周围皮肤不一样的皮肤增生。光线性角化病是皮肤癌的癌前病变。PDT 也可用于治疗某些发生在皮肤表面的皮肤癌, 即浅表性皮肤癌。

PDT 治疗分为两个步骤:

1. 在治疗区域涂上一种使其对光非常敏感的药物。您必须等待 \_\_\_\_\_ 小时, 让药物完全吸收。
2. 您的医疗保健提供者会用红光或蓝光照射该区域。照射光将与药物发生反应。发生反应后可破坏光化性角化病或皮肤癌。

### 为治疗做准备

如果您有下述情况, 请告知您的医疗保健提供者:

- 对大豆过敏。
- 正在服用任何药物。您可能需要停用某些药物, 因为药物可能会影响 PDT 的作用方式。如果您正在服用以下药物, 请告知您的医疗保健提供者:
  - 处方药物。
  - 非处方药。
  - 视黄醇类化合物 (眼霜、精华液和保湿霜中的化合物)。
  - 草药疗法。
  - 维生素。
  - 膳食补充剂。
  - 正在服用或近期服用过抗生素。
- 有口腔或生殖器疱疹病史。包括反复发作的唇疱疹、感冒疱疹或带状疱疹 (引起皮疹的病毒感染)。
- 目前处于唇疱疹或带状疱疹的爆发期。
- 患有卟啉症, 一种以皮肤对阳光敏感为症状的罕见疾病。
- 对 5-氨基乙酰丙酸 (ALA) 过敏。
- 已怀孕或计划怀孕。该治疗尚未用于妊娠期女性, 因此我们不清楚其是否安全。
- 对光线或太阳敏感。

### 治疗当天

- 治疗当天，请勿在治疗区域涂抹乳膏、乳液或化妆品。
- 治疗当天，请勿对治疗区域进行剃毛。
- 如果您有疱疹病史，请按照医疗保健提供者的指示在治疗前服用 Valtrex® 处方药。
- 请携带保护治疗区域免受天气影响的物品。
  - 如果治疗区域位于面部，请携带宽边帽或雨伞。
  - 如果治疗区域不在面部，请穿着能够遮住该区域的衣服。
- 计划在预约地点待上 \_\_\_\_\_ 个小时。

## 治疗期间

- 您的医疗保健提供者将用丙酮或酒精清除皮肤表面的油脂，为治疗区域做好准备。
- 您的医疗保健提供者将在治疗区域涂抹药物。该药物会让您的皮肤对阳光敏感。他们将告知您等待药物吸收的时间。在整个过程中，护士可能会一直在房间里陪同您。
- 治疗人员将向治疗区域照射红光或蓝光。这将有助于激活药物。在光照治疗期间，护士将让您佩戴护目镜。
  - 根据所使用光线的颜色，您的治疗时间可能会有所不同。
- 在光照治疗期间，您可能会感到不适。与晒伤感觉类似，例如刺痛、刺痒或烧灼感。我们将为您提供风扇以缓解不适。这些感觉通常会在治疗结束后消失，但可能需要 48 小时（2 天）后才会完全消失。

## 治疗结束后

每个人对该治疗的反应不尽相同。治疗后 1 至 2 周，您的治疗区域可能会出现：

- 与晒伤类似的发红
- 轻微肿胀
- 脱皮
- 瘙痒
- 脱屑
- 结痂
- 刺痛
- 渗液

您可能会出现轻微的流感样症状，如发热、寒战（感觉发冷和发抖）或身体疼痛。如果您出现流感样症状，请致电您的医疗保健提供者。

## 居家自我照护

请遵循以下指南，帮助应对这些副作用。

- 术后前 24 小时（1 天）内，对治疗区域进行冷敷（例如冰毛巾或冰袋）。为此，您需要：
  1. 拿一块干净的毛巾，将其浸入常温或冷水中。

2. 拧干后轻轻敷在治疗区域。
  3. 清凉感消失后，再次浸湿毛巾并重复上述步骤。
- 从治疗后第二天开始，使用温和和无香味的洁面产品（例如 Cetaphil®、Dove®、Basis® 或 Eucerin®）清洁治疗区域。使用干净的毛巾拍干皮肤，避免摩擦该区域。然后在给该区域涂抹保湿剂（例如 Cetaphil、Lubriderm®、Aquaphor® 或 Vaseline®），以保持皮肤湿润。
    - 保湿剂冷藏后有助于提升降温效果。
  - 如果您在治疗后出现不适，请服用非处方药，例如乙酰氨基酚 (Tylenol®)、布洛芬 (Advil®、Motrin®) 或阿司匹林。您可能对上述药物过敏或因患有某种疾病而无法使用。如果出现这种情况，请咨询您的医疗保健提供者，了解可使用哪种药物代替。
  - 您也可以使用抗组胺药（例如 Benadryl®）以缓解瘙痒或肿胀。使用该药物前，请咨询您的医疗保健服务提供者。
  - 治疗后 48 小时内，请勿将治疗区域暴露于强光之下。包括避免：
    - 阳光直射。
    - 阳光间接照射。
    - 非常明亮的室内灯光（例如聚光灯、影印机和医用检查灯）。可以暴露于正常室内照明。
    - 蓝光。请勿离明亮的电脑屏幕或电视屏幕太近。
  - 如果您在治疗后必须外出，请保护治疗区域免受阳光照射。如果您未遮盖治疗区域，请直接在该区域涂抹 SPF 至少为 30 的广谱防晒霜。广谱防晒霜是指可以阻挡 UVA 和 UVB 两种紫外线的防晒霜。如果治疗区域位于面部，请佩戴宽边帽。
  - 48 小时（2 天）后，请继续在治疗区域涂抹 SPF 至少为 30 的广谱防晒霜。
  - 如果治疗区域出现结痂，请勿将其剥离或扣掉。请涂抹保湿剂，例如 Aquaphor®、Vaseline® 或 Cetaphil®。
  - 请按照您的医疗保健提供者的指示返回医生办公室进行随访预约。

### **如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：**

- 出现 100.4 °F (38 °C) 或更高的发热，伴或不伴寒战。
- 发红、肿胀、脱皮、脱屑、开裂、结痂、刺痛、渗出或引流液等变得难以忍受或持续 2 周以上。
- 轻微流感样症状加重，久不缓解。
- 疼痛加重，久不缓解。
- 治疗区域出现水泡、脱屑或结痂。
- 有任何疑问或非预期问题。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Photodynamic Therapy - Last updated on May 21, 2022

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利

### 上次更新时间

May 21, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).

## 请告诉我们您的想法

### 请告诉我们您的想法

您的反馈有助于我们改进所提供的教育信息。您的医疗团队将无法看到您在本反馈表中填写的任何内容。请勿通过反馈表表达您的医疗需求。如果您对自己接受的医疗服务有任何疑问，请联系您的医疗保健提供者。

我们会阅读所有反馈，但不会回答任何问题。请勿在本反馈表中填写您的姓名或任何个人信息。

该信息是否易于理解？

- 是
- 尚可
- 否

我们应该更清楚地解释哪些方面？

请勿输入您的姓名或任何个人信息。