



患者及照护者教育

针对成人癌症患者的肺炎双球菌疫苗接种指南

本文信息介绍了肺炎双球菌疫苗以及应在何时接种疫苗。

肺炎双球菌疫苗有助于预防肺炎双球菌感染。这种细菌可引发肺炎（肺部感染）、脑膜炎（大脑周围的膜发炎）以及其他可能导致死亡的严重疾病。

有 2 种类型的肺炎双球菌疫苗：Pneumovax[®]23 与 Prevnar 13[®]。这两种疫苗都可以预防多种细菌菌株，通过肌肉注射接种。

疫苗接种时间安排

如果您从未接种过肺炎双球菌疫苗，并且您已年满 18 周岁，我们建议您：

- 在您下次与您的医疗保健提供者预约就诊时接种 Prevnar 13。
- 接种 Prevnar 13 至少 8 周后接种 Pneumovax 23。

如果您已接种 Pneumovax 23，请等 1 年后再接种 Prevnar 13。

如果您对肺炎双球菌疫苗有任何问题，请咨询您的医疗保健提供者。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on September 28, 2021

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利