

患者及照护者教育

# 甲状腺癌的放射性碘治疗：住院治疗

本资源将帮助您为住院放射性碘治疗做好准备。将向您介绍治疗前、治疗期间和治疗后可能发生的情况。

## 关于放射性碘治疗

放射性碘治疗可降低甲状腺复发的风险。它还用于治疗扩散到身体其他部位的甲状腺癌。

放射性碘通常以片剂形式给药。但如果吞服药片有困难，也可以液体形式给药。如果您希望服用液体剂型，请在治疗前告知您的分子影像与治疗服务 (MITS) 医生。MITS 有时称为核医学服务。

服用放射性碘时，放射性碘会进入血液，然后被甲状腺细胞吸收（摄取）。放射性碘会发出辐射，并随着时间的推移逐渐杀死甲状腺中的癌细胞。放射性碘还会杀死任何可能扩散到身体其他部位的甲状腺癌细胞。

## 放射性碘治疗前

### 遵循低碘饮食

开始治疗前，您必须遵循低碘饮食至少 1 周。低碘饮食将有助于取得更好的放射性碘治疗效果。如果您的饮食中碘含量过高，它会阻止甲状腺细胞吸收放射性碘。

治疗结束后继续遵循低碘饮食 24 小时（1 天），或遵照医生的指示。如需了解更多信息，请阅读 [低碘饮食 \(www.mskcc.org/chinese/cancer-care/patient-education/low-iodine-diet\)](http://www.mskcc.org/chinese/cancer-care/patient-education/low-iodine-diet)。

### 请与医生讨论您的治疗计划

医生会与您讨论您的治疗计划。您的治疗计划将遵循以下步骤，这些步骤将在几天内完成：

**第 1 天：**您将需要验血。验血之后，您将与医生见面。然后，护士将测量您的生命体征（心率、血压、体温和呼吸频率）。您还将接受促甲状腺素  $\alpha$  (Thyrogen<sup>®</sup>) 注射，帮助您做好治疗准备。注射的药物将帮助剩余的甲状腺细胞吸收放射性碘。

**第 2 天：**您会再接受一次促甲状腺素  $\alpha$  注射。注射完成后，您的医生将与您进行讨论，并就住院时间给出相关指导。

**第 3 天：**您将因接受放射性碘治疗而收治入院。大多数患者需住院 1 晚。您的医生将告知您是否需要延长住院时间。

在这一天，您会接受治疗剂量的放射性碘。

**3 至 5 天后：**治疗几天后，您将接受一次治疗后扫描。治疗后扫描有助于医生看见人体吸收放射性碘治疗的具体部位。

### 如果您有备孕计划，请与您的医生讨论

如果您有任何备孕计划，请在治疗前与您的医生讨论。

遵循以下内容很重要：

- 在接受放射性碘治疗后至少 6 个月内，请勿怀孕或让他人怀孕。
- 在接受放射性碘治疗后至少 6 个月内，请采取避孕措施。使用避孕措施预防怀孕。

遵循这些指引的时间可能会超过 6 个月，具体时间视医生告知内容而定。

### 停止哺乳或吸乳

您必须在治疗前至少 12 周（3 个月）完全停止哺乳或吸乳。这将有助于防止放射性碘在产生乳汁的乳腺组织中聚集。

治疗后，您无法为您的孩子继续哺乳或吸乳。因为母乳会让他们暴露于辐射中。如果您将来再次生育，您可以安全地为婴儿哺乳或吸乳。

如果您对哺乳或吸乳及您的治疗有任何疑问，请咨询您的医生。如果治疗后您有备孕计划，请与您的医生讨论您的计划。

## 联系您的保险公司

医生查看您的治疗计划后，请联系您的保险公司。咨询您接受任何治疗和检查前是否需要事先授权？事先授权是指由保险公司决定是否必要进行检查、治疗或医疗程序的决定。如果您对您的保险公司的事先授权有任何疑问，请致电 646-227-3378 联系 MSK 的患者账单部门。

## 请留意您的治疗时间

在治疗前一天的下午 2 点后，工作人员将打电话给您。如果您的医疗程序安排在周一，他们会在周五提前致电联系您。如果您在晚上 7 点前未接到电话，请致电 212-639-7881。

工作人员将告知您到医院进行该手术的时间。他们还会提醒您抵达的地点。

## 放射性碘治疗当日

### 淋浴

- 您可以在治疗前一天晚上或当天早晨用肥皂和清水进行淋浴。
- 您可以使用您常用的除臭剂、乳液、乳霜和化妆品。

### 药物

- 与您的医生讨论您的甲状腺药物。如果医生告诉您可以，您便可在治疗当天服用。
- 按平时的习惯服用所有其他药物。

### 饮食

- 您的治疗可能在下午进行，治疗前的午餐或零食请遵循清淡、低碘的原则。
- 治疗前 2 小时内请勿进食。治疗前 2 小时内可饮用低碘液体（例如水）。
- 治疗结束后，您将在医院病房内吃晚餐。

### 随身携带的物品

您将待在私人病房内。病房内有电话、电视和洗手间。

您应携带以下物品：

- 白天穿着的宽松舒适的衣服。
- 睡觉时穿着的衣服或睡衣。
- 洗漱用品，例如肥皂、牙刷、除臭剂、洗发水和护发素。
- 如果您认为那时您可能处在月经期，请备好卫生巾或卫生棉条。如果使用卫生棉条，请确保频繁地更换。
- 帮助您打发时间的物品，比如书籍、杂志、笔记本电脑、iPad 或手机。

治疗完成后，您可以将这些物品带回家。这些物品上沾染的少量辐射不会对您或他人造成伤害。

### 前往何处

按时到达医院接受住院放射性碘治疗，这一点非常重要。

请从约克大道 1275 号（东 67 大街和东 68 大街之间）进入医院。住院部在大楼入口右手边。

### 预期情况

如果有空出的私人病房，您将被尽快带至病房内。您将在入院当天开始接受治疗。

当您在病房内时：

- 您的医生、护士和健康物理师将与您见面。健康物理师负责确保辐射的使用在安全范围之内，从而保护他人和周围环境。您的医生、护士和健康物理师可以回答您关于治疗的任何问题。
- 您的医生、护士和健康物理师将会告知您在治疗后必须遵循的辐射预防措施。您将会得到这些指示的书面版本。然后，您需要签署一份

知情同意书（一份表明您同意该治疗并理解其风险的同意书）。

- 您的护士会在治疗开始前与您确认。您还将获得防止恶心（感觉想吐）或呕吐的药物。服药后至少 1 小时请勿进食或遵医嘱。

## 治疗期间

您的医生将在您的病房内进行放射性碘治疗。您将获得的剂量取决于您的验血和扫描结果。

- 如果护士向您分发了片剂形式的放射性碘，您可能需要服用 1 片或多片，具体取决于您的剂量。您需要随水服用。
- 如果护士向您分发了液体剂型的放射性碘，您可能需要服用 1 茶匙（5 毫升）液体。您将用吸管从小药瓶中吸取药液。液体呈透明状，几乎没有或完全没有任何味道。大多数人觉得它的味道像水，但有些人表示有轻微的陈腐或霉味。

## 在医院病房中

治疗结束后，您必须一直待在您的病房内。病房门可一直敞开。

治疗后 24 小时，您必须开始吸吮酸味硬糖果。这有助于缓解唾液腺出现的副作用，例如口干。唾液腺是产生唾液（口水）的腺体。

照护您的医院工作人员已接受过关于辐射安全的培训。他们可能会进入您的病房，但停留时间不会太长。他们将在门口与您交谈。如果您需要帮助或有任何问题，如恶心或胃痛，请告知您的护士。

我们将采用防护罩控制病房内物品接受的辐射量。我们可能会在病房电话、床边桌和浴室放置防护罩。厕所里将放置一次性地垫，防止尿液（小便）溅到地板上。我们将为您提供一个垃圾桶，辐射安全工作人员每天会清理您的垃圾。

接受治疗后，您可能不会立即出现副作用，但稍后可能会出现。如需了解更多信息，请阅读“副作用”部分。

## 放射性碘治疗后

### 出院

治疗结束后的早晨，您的健康物理师将测量您体内的辐射水平。他们将使用手持式设备测量。如果您体内的辐射量足够低，则可出院。出院后，您可能需要遵循更详细的辐射安全指南。出院前，您的医疗保健提供者将就此事与您讨论。

### 辐射安全注意事项

治疗后，您的身体会具有放射性。请遵循下方关于辐射安全的说明以及医疗保健提供者给您的相关说明。这些说明有助于确保您周围人士的安全。

### 与他人接触

- **时间：**限制您与其他人相处的时间。您与他人接触的时间越少，他人接触到的辐射也就越少。
- **距离：**请与他人保持安全距离。您与他人保持的安全距离越远，他人接触到的辐射也就越少。
  - 尽量与孕妇和 18 周岁以下的人士保持至少 6 英尺（2 米）的距离。在医生说明您可再次与他人安全交往之前，请遵循上述说明。
  - 接下来 24 小时内，尽量与所有其他人保持至少 3 英尺（1 米）的距离。保持安全距离的时间可能会超过 24 小时，具体时间视医生告知内容而定。
  - 接下来 2 至 3 天，请勿与任何人共睡一张床。睡觉时尽量与他人保持至少 6 英尺（2 米）的距离。
- **如果您与婴儿、儿童或孕妇共睡一张床，请致电 212-639-7391 联系保健物理部。**他们会向您提供需遵循的具体辐射安全注意事项。您可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点致电联系。
- **如果您是婴儿或 18 周岁以下人员的主要照顾者，请致电 212-639-7391 联系保健物理部。**他们会向您提供需遵循的具体辐射安全注意事项。您可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点致电联系。

### 出行

某些安全设备（如机场内或隧道外的）可以检测到非常少量的辐射。工作人员会给您一张钱包卡，上面写着您已服用放射性药物。该卡将显示，您在治疗后 3 个月内可能会释放少量辐射。如果您在检查站被执法人员拦住，请出示这张卡片。

### 返回工作岗位

您的健康物理师将告知您何时可以返回工作岗位。通常是治疗后 1 到 2 天，但时间也可能更长。具体取决于您的工作类型以及是否会与其他人密切接触。

## 性生活

- 您的健康物理师将告诉您治疗结束后何时再次开始性生活是安全的。
- 询问您的医生有关使用避孕措施预防怀孕的信息。在接受治疗后至少 6 个月内，请勿怀孕或让他人怀孕。尝试怀孕前，请咨询医生。

## 体内放射性碘的清除

部分放射性碘会被甲状腺细胞吸收，但也有一些残留。大部分残留的放射性碘将通过尿液（小便）排出体外。少量将通过唾液（吐痰）、汗液和排便（粪便）排出体外。

请遵循以下指南，让放射性碘更快地排出您的身体。

- **大量饮用液体。** 治疗后，请立即尝试每天至少饮用 8 杯（8 盎司）液体。多喝水和水基饮料。治疗后至少 5 至 7 天内，请坚持饮用液体。您不必在夜间专门醒来饮用液体。仅需在清醒时饮用即可。
- **请尽可能多地排尿（小便）。** 您的尿液将具有放射性，因此，请尽可能多地排尿，以排空膀胱。每次感觉到有尿意时，请尽量排尿，不要憋尿。
  - 排尿时，尽量不要使尿液溅到马桶外面。如果您确实将尿液溅到马桶外面，请佩戴手套，并用通用清洁消毒剂进行清洁。
  - 如果您通常是站着排尿（小便），请尝试采用坐姿排尿。这样可以避免您将尿液溅到马桶以外的地方。请在治疗后 2 天采用坐姿排尿，除非您的医疗保健提供者给予其他指示。
- **请尽可能多去卫生间（排便）。** 您排出的大便也将具有放射性。一周内，请尽可能多去卫生间，以排空结肠。
  - 便秘是指排便比平时少、排便困难，或两者兼而有之。如果您经常便秘，请在治疗前询问您的医生是否需要服用通便药物。通便药物是指有助于排便的药物。如果您在治疗结束后 24 小时内仍未排便，请咨询您的医生。
- **吸吮酸味硬糖果。** 有些人治疗后会出现口干的情况。为解决这个问题，您可在治疗后 24 小时开始吸吮酸味硬糖果。治疗后 3 天内请继续这样做。酸味硬糖果可以帮助您产生更多唾液，促使放射性碘排出体外。
- **联系您的护士。** 如果您有任何问题，如恶心或胃痛，请致电您的护士。

## 饮食

- 您可以在治疗后 24 小时重新开始正常饮食，除非医生另有指示。
- 治疗后 5 至 7 天内，请大量饮用液体。每天至少饮用 8 杯（8 盎司）液体。
- 如果您饮酒，每天最多饮用一两杯。

## 药物

- 如果您过去曾被告知停止服用甲状腺药物，请在治疗后第二天再次开始服用。请遵医嘱。
- 请在治疗后第二天再次开始服用其他处方药。请遵医嘱。
- 出院时，您的医疗保健提供者会给您开一些抗恶心药物带回家。治疗后，请根据需要服用。

## 副作用

治疗后您可能会出现一些副作用。其中可能包括：

- **服用放射性碘后立即出现轻度恶心。** 您的医疗保健提供者将在治疗前给您开具抗恶心药物，以便预防这种情况的发生。
- **脸颊肿胀。** 这是由放射性碘对唾液腺的刺激或损伤所引起。唾液腺是产生唾液的腺体。肿胀最早可能发生在治疗后的第二天早上。治疗结束后，肿胀可能会持续一年。如果您出现以下情况，请致电您的医生：
  - 唾液腺疼痛、肿胀。
  - 唾液有异味。
  - 唾液气味难闻。
- **口干。** 这也是由放射性碘对唾液腺的刺激或损伤所引起。如果您服用的放射性碘剂量较大，可能会出现口干的情况。为解决这个问题，请按照医生的指示大量饮用液体。治疗后吸吮酸味硬糖果也可能会有所帮助。治疗结束后可能会立即发生口干，也可能在治疗后数月至 1 年内发生。在极少数情况下，口干可能是永久性的（无法缓解）。
- **味蕾刺激引起的味觉变化。** 治疗结束后，食物尝起来可能会有咸味或金属味。这种情况只是暂时的，通常会在治疗后 8 周内好转。您可

以尝试不同口味的食物，确保您获得所需的营养。

- **颈部不适。**这通常发生在治疗后的前 2 至 3 周。具体持续时间取决于您颈部的甲状腺组织量。可服用非处方镇痛药，如对乙酰氨基酚 (Tylenol®)。治疗也可能引发颈部肿胀，致使您呼吸困难，但这种情况极为少见。这种副作用比较严重。



如果您出现呼吸困难，请立即前往最近的急诊室。请他们致电联系 MSK 的医生。

## 放射性碘治疗后的随访治疗

治疗后 3 到 5 天，您将与 MITS 进行随访预约。随访期间，您将接受治疗后扫描，查看人体吸收放射性碘治疗的具体部位。

前往随访预约处前，请确保：

- 用肥皂和清水进行淋浴。
- 用洗发水彻底清洗头发。
- 穿着干净的衣服。请勿穿着在放射性碘治疗期间或治疗后穿过的衣服。

干净的皮肤、头发和衣服有助于放射技师从扫描中获得清晰的图像。

如果您对扫描有任何疑问，请致电 212-639-6652 联系 MITS。

在您接受复查期间，您的医生还可能：

- 根据您的医疗保健需求为您安排其他扫描。
- 安排您验血，以便确定是否需要调整您的甲状腺药物剂量。

首次随访预约后，您将在 6 个月后再次进行随访。

您可在 MSK MyChart (MSK 的患者门户网站) 查看关于您随访预约的信息。如果您没有 MSK MyChart 帐户，请致电 212-639-6652 联系 MITS。他们会向您提供关于您随访预约的信息。

## 联系方式

如果您有任何医疗问题，请致电您的内分泌科医生。您可在周一至周五上午 9 点至下午 5 点联系到工作人员。如果下午 5 点以后，以及周末和节假日需联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。并请内分泌科值班医生接听电话。

如果您对预约时间或治疗有任何疑问，请致电 212-639-6652 联系 MITS。您可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点致电联系。

如果您对辐射安全有任何疑问，请致电 212-639-7391 联系保健物理部。您可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点致电联系。

## 资源

Access-A-Ride

[web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm](http://web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm)

877-337-2017

在纽约市，MTA 为无法乘坐公共交通的残疾人提供共享的乘车、上门服务。

Air Charity Network

[www.aircharitynetwork.org](http://www.aircharitynetwork.org)

877-621-7177

提供往返治疗中心的交通。

美国癌症协会 (ACS)

[www.cancer.org](http://www.cancer.org)

800-ACS-2345 (800-227-2345)

提供各种信息和服务，包括 Hope Lodge® 社区。这是为患者和照护者在癌症治疗期间提供的免费住所。

#### 美国甲状腺协会

[www.thyroid.org](http://www.thyroid.org)

为甲状腺患者、患者家属和其他感兴趣的公共社区提供最新信息。

#### Light of Life 基金会

[www.lightoflifefoundation.org](http://www.lightoflifefoundation.org)

(609) 409-0900

为甲状腺癌患者提供医疗信息和支持。

#### 美国国家癌症研究所 (NCI)

[www.cancer.gov](http://www.cancer.gov)

800-4-CANCER (800-422-6237)

提供关于癌症的各种信息，包括治疗指南汇总。还包括研究新闻、临床试验列表、医学文献链接等。

#### 癌症治疗后的生活资源 (RLAC) 项目

646-888-8106

在 MSK，我们会在治疗结束后持续为您提供医疗照护。[RLAC 项目](#)专为已经完成治疗的患者及其家属设计。此项目可提供多项服务。我们提供与完成治疗后的生活相关的研讨会、讲习班、支持小组和咨询服务。还提供有关保险和就业问题的帮助。

#### ThyCa: Thyroid Cancer Survivors' Association, Inc.

[www.thyca.org](http://www.thyca.org)

877-588-7904

该网站提供关于甲状腺癌的最新信息，并为处于甲状腺癌任何阶段的患者提供支持服务。该网站还为照护者提供信息。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

---

Radioactive Iodine Therapy for Thyroid Cancer: Inpatient Treatment - Last updated on January 23, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利

#### 上次更新时间

一月 23, 2024

Learn about our [Health Information Policy](#).

## 请告诉我们您的想法

## 请告诉我们您的想法

您的反馈有助于我们改进所提供的教育信息。您的医疗团队将无法看到您在本反馈表中填写的任何内容。请勿通过反馈表表达您的医疗需求。如果您对自己接受的医疗服务有任何疑问，请联系您的医疗保健提供者。

我们会阅读所有反馈，但不会回答任何问题。请勿在本反馈表中填写您的姓名或任何个人信息。

该信息是否易于理解？

是

尚可

否

我们应该更清楚地解释哪些方面？

请勿输入您的姓名或任何个人信息。