



患者及照护者教育

重组人促甲状腺激素和放射性碘治疗： 两周疗程

本信息介绍了重组人促甲状腺激素 (TSH) 的两周疗程。疗程是指治疗过程。

放射性碘治疗有助于降低甲状腺癌复发的风险。还可用于治疗已经扩散的甲状腺癌。

护士将告知您更多信息，向您说明如何为治疗做好准备，以及治疗期间和治疗后可能发生的情况。

遵循低碘饮食

接受治疗前，您需要遵循低碘饮食。您的护士会给您一份名为 *低碘饮食* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/low-iodine-diet) 的资源，其中包含有关如何遵循低碘饮食的更多指导。

在疗程第一天（第 1 天）前 ____ 天开始低碘饮食。

每天摄入至少 8 杯（8 盎司）不含咖啡因的液体。液体应包括水和低碘饮食指南中列出的其他饮料。

疗程安排

在疗程的第一周，您将接受血液检查、扫描重组人促甲状腺激素注射。您还将接受治疗。

您可能需要入院接受治疗。如果您被收治入院，当您体内的放射量低到可以安全出院时，即可出院回家。如果您未被收治入院，辐射安全员将在治疗时为您提供更多指导。

在疗程的第二周，您将接受治疗后扫描。分子影像与治疗服务 (MITS) 的工作人员将为您安排该项目。MITS 有时称为核医学服务。

下表列出了疗程期间可能发生的情况，以及发生的时间。如果您对疗程有任何疑问，请咨询您的医疗保健提供者。

第 1 周 可能会从周一、周二或周三开始	第 1 天 (2 至 3 小时) <ul style="list-style-type: none">• 血液检查• 重组人促甲状腺激素注射
	第 2 天 (30 至 60 分钟) <ul style="list-style-type: none">• 重组人促甲状腺激素注射• 放射性碘诊断剂量
	第 3 天 (6 至 8 小时) <ul style="list-style-type: none">• 扫描• 放射性碘治疗剂量
第 2 周	治疗后扫描

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Recombinant Human TSH and Radioactive Iodine Treatment: 2-Week Regimen - Last updated on March 12, 2019

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利