Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

紧急医疗中心和对症医疗诊所护理出院指导：血液稀释药物

本信息介绍了紧急医疗中心 (UCC)/对症医疗诊所 (SCC) 针对血液稀释药物的护理出院指导。

血液稀释药物

您出院后需要服用一种使血液更难凝固的药物。 这意味着您会更容易出血。

- 因此请在日常生活中格外小心，如刷牙、剃须等。
- 避免可能导致您撞伤、擦伤或割伤的活动。
- 请遵医嘱服用药物。 请勿漏服药物，除非您的医疗保健提供者另有指示。
- 请查看您的医疗保健提供者为您提供的患者教育信息。

在服用下述任何药物前，请咨询您的医疗团队：

- 其他可能稀释血液的药物，如 NSAIDS（非甾体抗炎药，包括布洛芬和阿司匹林）。
- 任何新的非处方药、维生素或补充剂。
- 请参阅提供给您的药物相关资料。

如果出现以下情况，请致电您的 MSK 医疗团队或前往最近的急诊室就诊：

- 黑便或血便
- 咳血或呕血
- 流鼻血
- 牙龈出血
- 意识模糊
- 头部受伤
- 无法止住的出血

您的医疗团队可能会指导您前往所在地区的对症医疗诊所 (SCC)/紧急医疗中心 (UCC) 就诊。

请在出院后与您的 MSK 医疗团队完成随访。

您可以在 MSK 的患者和照护者教育库中搜索关于该主题以及许多其他主题的信息，网址为 www.mskcc.org/pe

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Blood Thinning Medication - Last updated on September 3, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利