Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

紧急医疗中心和对症医疗诊所护理出院指导：输血

本信息介绍了紧急医疗中心 (UCC)/对症医疗诊所 (SCC) 针对输血的护理出院指导。

输血

如果您出现胸痛，请立即**拨打 911** 急救电话。

如果您通过手臂或腿部静脉接受输血，针头刺入部位可能会出现淤青、发红或刺激。 如果瘀青、发红或刺激引起疼痛或疼痛加重，请联系您的医疗团队。

输血后 2 天内，均可能会引起过敏反应。 如果出现以下情况，请致电您的 MSK 医疗团队或前往最近的急诊室就诊：

- 发热 ⩾ 100.4°F (38 °C)。
- 颤抖性寒战。
- 面部发红和温热感。
- 荨麻疹、皮疹或瘙痒。
- 呼吸困难或呼吸短促。
- 下背部疼痛。

- 恶心（想要呕吐的感觉）或呕吐。
- 虚弱或晕厥。
- 尿液呈深色。

您的医疗团队可能会指导您前往所在地区的对症医疗诊所 (SCC)/紧急医疗中心 (UCC) 就诊。

请在出院后与您的 MSK 医疗团队完成随访。

如需了解更多信息，请访问 www.mskcc.org/pe/blood_transfusion。

您可以在 MSK 的患者和照护者教育库中搜索关于该主题以及许多其他主题的信息，网址为 www.mskcc.org/pe

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Blood Transfusion - Last updated on September 3, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利