



患者及照护者教育

紧急医疗中心和对症医疗诊所护理出院 指导：脱水

本信息介绍了紧急医疗中心 (UCC)/对症医疗诊所 (SCC) 针对脱水的护理出院指导。

脱水

脱水（体内液体不足）可能会降低血压。每天至少饮用 6-8（8 盎司）杯水或其他液体以保持充分补水。如果您感觉恶心（感觉想吐），请经常饮用少量液体。根据耐受情况适量增加饮用量。

站起来时请缓慢变换体位，以避免头晕。

如果您有新发头晕或者头晕加重，或难以摄入液体，请致电您的 MSK 医疗保健团队或前往最近的急诊室就诊。您的医疗团队可能会指导您前往所在地区的对症医疗诊所 (SCC)/紧急医疗中心 (UCC) 就诊。

请在出院后与您的 MSK 医疗保健团队完成随访。

您可以在 MSK 的患者和照护者教育库中搜索关于该主题以及许多其他主题的信息，网址为 www.mskcc.org/pe

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Dehydration - Last updated on April 17, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利