

患者及照护者教育

紧急医疗中心和对症医疗诊所护理出院指导：腹泻

本信息介绍了紧急医疗中心 (UCC)/对症医疗诊所 (SCC) 针对腹泻的护理出院指导。

腹泻

腹泻（稀便、水样便）可能会导致脱水（体内液体不足）和电解质损失。每天至少饮用 6-8（8 盎司）杯水或其他液体以保持充分补水。

请遵医嘱服药。

请查看您的医疗保健提供者为您提供的患者教育信息。如需了解更多信息，请访问 www.mskcc.org/pe/diarrhea

如果出现以下情况，请致电您的 MSK 医疗团队或前往最近的急诊室就诊：

- 腹泻不受控制。
- 腹泻带血或呈黑色。
- 新发腹痛或腹痛加重。
- 腹部肿胀。
- 肌肉痉挛。
- 头晕或者感觉非常虚弱无力。

您的医疗团队可能会指导您前往所在地区的对症医疗诊所 (SCC)/紧急医疗中心 (UCC) 就诊。

请在出院后与您的 MSK 医疗团队完成随访。

您可以在 MSK 的患者和照护者教育库中搜索关于该主题以及许多其他主题的信息，网址为 www.mskcc.org/pe

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Diarrhea - Last updated on April 17, 2026
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利

上次更新时间

四月 17, 2026

Learn about our [Health Information Policy](#).

请告诉我们您的想法

请告诉我们您的想法

您的反馈有助于我们改进所提供的教育信息。您的医疗团队将无法看到您在本反馈表中填写的任何内容。请勿通过反馈表表达您的医疗需求。如果您对自己接受的医疗服务有任何疑问，请联系您的医疗保健提供者。

我们会阅读所有反馈，但不会回答任何问题。请勿在本反馈表中填写您的姓名或任何个人信息。

该信息是否易于理解？

- 是
- 尚可
- 否

我们应该更清楚地解释哪些方面？

请勿输入您的姓名或任何个人信息。