Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

对造影剂产生反应后该怎么做

该信息解释了对造影剂产生反应后该做些什么。

您对以下造影剂有反应：

磁共振成像 (MRI) 造影剂：

☐ 钆布醇 (Gadovist®)

☐ 钆塞酸二钠 (Eovist®)

☐ 钆特酸葡胺 (Clariscan™)

☐ 钆特酸葡胺 (Dotarem®)

☐ 钆哌啶醇 (Elucirem™)

☐ 钆哌啶醇 (VUEWAY™)

计算机断层扫描 (CT) 造影剂：

☐ 碘海醇 (Omnipaque™)

☐ 碘帕醇 (Isovue®)

您今天应该做什么

☐ 前往紧急护理中心或当地急诊室。

☐ 扫描后回家。

- 如果出现以下任何症状，请前往最近的急诊室就诊或拨打 911：
  - 呼吸困难
  - 感到呼吸短促
  - 胸痛
- 如果出现任何新发或令人担忧的症状，请致电安排此项扫描的医生。

☐ 您服用了苯海拉明 (Benadryl®)，可能会让您感到困倦。

- 不要自己开车回家。 我们将根据需要协助做出安排。
- 如果突然出现剧烈的眼睛疼痛或排尿困难，请前往最近的急诊室就诊。

进行下次造影扫描前应该做些什么

告知所有医疗保健提供者您有这种反应。 我们已将造影剂反应输入到您的 MSK 病历中。

对于将来的 ☐ CT 扫描 ☐ MRI 造影扫描，请遵循以下说明：

☐ 您的反应是造影剂的副作用，而不是过敏。 下次您再进行这种造影时，我们将采取措施减少副作用。

☐ 您的反应是轻度过敏反应。 下次扫描前不要做任何改变。

☐ 您的反应是中度过敏反应。 安排扫描的医生会给您开具类固醇

药物的处方。 他们可能还会给您开具苯海拉明的处方。 在每次进行（选一项）☐ MRI ☐ CT 造影扫描的前一天开始服用这些药物。请遵医嘱。

☐ 您的反应是重度过敏反应。 在进行下一次（选一项）☐ MRI ☐ CT 扫描前，请先与医生讨论您的过敏情况。

如果您有任何疑问，请致电 _____ 并要求与护士通话。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

What to Do After Your Reaction to Contrast Dye - Last updated on July 31, 2023
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利