

麻疹问与答

为应对近期纽约市与周边地区爆发的麻疹疫情，MSK正对儿科病院的病人与访客进行与麻疹症状有关的筛检，我们也会询问您近期是否曾与麻疹患者接触。麻疹对在接受癌症治疗的病人，可以引发严重的病情。以上的措施是为了保护我们病人的安全，请见谅。

麻疹警报

谁会得麻疹？

任何人都有机会得麻疹。以目前纽约的疫情而言，大部分的患者从未接种疫苗。麻疹疫苗的名字是MMR（麻疹、流行性腮腺炎与德国麻疹）。

麻疹是如何传播的？

麻疹是一种高传染性的疾病，病毒在患者打喷嚏或咳嗽时，透过空气传播。病毒在两小时内仍具备传染性，所以即使患者已经离开，您也可能受到传染。

感染麻疹后有何症状？

麻疹是严重的呼吸系统疾病。病人一开始会发烧、流鼻水、眼红及咳嗽。3到5天后，脸上会出现红疹，并扩散全身。

患者在症状出现前具有传染性吗？

是的。患者在红疹出现前4天已经有传染性，传染力会持续到红疹出现4天后才停止。

接触病毒后多久才会发病？

一般而言在接触病毒后10到12天开始出现症状，但有些患者可以提前在第7天或者延后到第21天出现症状。

接种疫苗可以让我孩子预防麻疹吗？

是的。在美国，大部分的人在6岁前已经接种两剂MMR疫苗。但MMR是一种活性疫苗，对在接受癌症治疗的儿童不安全。

与我孩子接触的人可以接种疫苗吗？

可以。接受癌症治疗儿童的家人与照护者接种疫苗是安全的。其实保护孩子安全的最好方法就是确保孩子身边每个人都按规定接种疫苗。

我的孩子接触了麻疹该怎么办？

请马上告知医疗团队。如果孩子接触了麻疹患者，可以用一种免疫球蛋白来防止麻疹。

MSK如何保护儿科病人免受麻疹感染？

我们会对所有病人、父母和儿科病院的访客进行与麻疹症状有关的筛检，也会询问他们是否曾与麻疹患者接触。

我如何能取得更多的资讯？

有关最近麻疹病例通报的地区，可在疾病控制中心的网站查询。网址是 www.cdc.gov/measles。



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

如果您有更多的问题与担心的事情，
请予您的医疗团队联络。