



患者及照顧者教育

## 如何遵循 7 級易咀嚼飲食

本資訊解釋了甚麼是 7 級易咀嚼飲食以及如何遵循該種飲食。解釋了如何測試食物的大小和厚度。還列出了遵循這種飲食時應攝入和避免的食物。

### 甚麼是 7 級易咀嚼飲食？

7 級易咀嚼飲食法是指只吃軟質、柔嫩且需要較少咀嚼次數的食物。您可以吃不同質地和厚度的食物，包括切碎、磨碎和泥狀的食物。

遵循 7 級飲食時，您需要避免以下類型的食物：

- 堅硬、乾燥、堅韌、彈牙或高纖食物，例如新鮮菠蘿、未經煮熟的蔬菜和堅果。
- 酥脆、鬆脆、刺鼻的食物，如未經煮熟的蘋果和粟米片。
- 質地黏稠的食物和籽類，例如四季豆、南瓜籽和大黃。
- 甜膩或黏性食物，例如焦糖和乾果。

### 我為何需要遵循 7 級易咀嚼飲食？

如有以下情況，則您可能必須遵循這種飲食：

- 患有吞嚥困難。吞嚥困難是指您難以吞嚥。

- 難以咀嚼乾果等堅硬的食物。
- 難以咀嚼棉花糖等有咬口的食物。
- 做過口腔手術。
- 口腔的某些部位（例如嘴唇或舌頭）失去知覺。
- 難以移動口腔某些部位。

## 我該如何確保食物夠軟？

您可以利用叉子壓力測試來檢查食物的柔軟度。請遵循本節的步驟操作。

食物的質地會根據溫度和烹飪方式而改變。在開始食用前先測試食物，以確保其柔軟度適中。

### 叉子或湯匙壓力測試

將叉子或湯匙放在食物上方。用拇指按下叉子或湯匙，直到部分指甲變白。如果食物被完全壓扁且不會恢復到原來形狀，那麼您的食物就夠軟了。您的食物也應該很容易用叉子或湯匙的側面分開。




圖 1. 叉子或湯匙壓力測試

## 我在遵循 7 級易咀嚼飲食時可以食用甚麼食物？

以下是您在遵循這種飲食時可以食用的一些食物。我們還列出了一些您應該避免的食物。

這些列表並未完整列出您在遵循此飲食時可以食用的所有食物。如您測試過其他食物而它們足夠柔軟且大小適中，則可能可以食用。

## 牛奶和乳製品

應食用的牛奶和乳製品	應避免的牛奶和乳製品
<ul style="list-style-type: none"><li>● 乳酪。</li><li>● 茅屋芝士及乳清芝士。</li><li>● 忌廉芝士和酸忌廉。</li><li>● 芝士塊。</li><li>● 雪糕、乳酪雪糕、意式雪糕、奶昔及沙冰。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 附堅果、椰子和燕麥脆片等硬質配料的乳酪。</li><li>● 任何抹上難以咀嚼的粗糙添加物（例如堅果等）的芝士。</li></ul>

## 蛋白質

應食用的蛋白質	應避免的蛋白質
<ul style="list-style-type: none"><li>● 牛肉、豬肉和羊肉等紅肉。</li><li>● 雞肉和火雞肉等家禽。</li><li>● 魚、蝦、龍蝦、蜆和扇貝等海鮮。</li><li>● 熟食肉類。</li><li>● 易咀嚼的煙肉和香腸。</li><li>● 雞蛋和法式蛋批等雞蛋替代品。</li><li>● 嫩肉或碎肉砂鍋菜。</li><li>● 柔滑堅果醬</li><li>● 豆腐或豆豉等經處理的大豆食</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾硬的連骨紅肉。</li><li>● 乾硬的家禽或魚類。</li><li>● 粒粒堅果醬或葵花子醬。</li><li>● 原粒堅果。</li><li>● 全熟的脆煙肉。</li></ul>

品。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 素食漢堡等預製肉類替代品。</li> <li>● 乾豆、扁豆或豌豆等經處理的濕潤豆類。</li> <li>● 吞拿魚、雞肉或海鮮沙律。</li> </ul>	
---	--

## 蔬菜

應食用的蔬菜	應避免的蔬菜
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有煮熟的軟質蔬菜。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有未經煮熟的蔬菜。</li> <li>● 四季豆、豆莢和大黃等煮熟的高纖維蔬菜。</li> </ul>

## 水果

應食用的水果	應避免的水果
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有罐裝和熟製水果。</li> <li>● 柔軟、去皮的新鮮水果（例如水蜜桃、桃駁李、奇異果、哈密瓜、白蘭瓜、無核西瓜）。</li> <li>● 士多啤梨等附有小籽的軟莓果。</li> <li>● 牛油果，包括牛油果醬。</li> <li>● 加入至其他菜餚的濕潤熟製提子乾。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 難以咀嚼或去皮的生鮮水果，例如蘋果、梨、西梅和提子。</li> <li>● 乾果、冷凍乾果和水果零食。</li> <li>● 黏稠的水果，例如杏、菠蘿和芒果。</li> </ul>

## 澱粉質

應食用的澱粉質	應避免的澱粉質
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 去皮焗薯。</li> <li>● 所有足夠濕潤、軟質的熟穀物。</li> <li>● 所有足夠濕潤的冷穀物。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 連皮焗薯。</li> <li>● 法式麵包或法式長棍等厚皮麵包。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 粗麵粉、意粉、藜麥、米飯和菰米等所有澱粉類食物。</li> <li>● 牛角包、白方飽和鬆餅。</li> <li>● 熱製單面三文治（有或沒有醬汁）。</li> <li>● 凍三文治。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 夾有堅果或籽類的三文治。</li> <li>● 乾薄脆、薯片、爆谷、和墨西哥粟米餅。</li> <li>● 爆谷和糯米糕。</li> </ul>
--	---

## 脂肪

應食用的脂肪	應避免的脂肪
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 牛油、植物牛油和油。</li> <li>● 牛油果。</li> <li>● 蛋黃醬、酸忌廉、肉汁和沙律醬。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有堅果及籽類。</li> <li>● 椰子。</li> </ul>

## 湯類

應飲用的湯類	應避免的湯類
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 需要避免清單上所列之物以外的所有湯類。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 含有堅硬肉類或未煮熟蔬菜的湯。</li> <li>● 含有大片肉塊或蔬菜的湯。</li> <li>● 未過濾的粟米或周打蜆湯。</li> </ul>

## 甜點和甜品

應食用的甜點和甜品	應避免的甜點和甜品
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 布甸、吉士和鮮忌廉。</li> <li>● 雪糕、所有雪葩。</li> <li>● 不含餅皮或餅底的紐約芝士蛋糕。</li> <li>● Jell-O® 等果凍、果味冰和雪條。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 附乾果的蛋糕。</li> <li>● 有咬口、黏糯或非常乾的蛋糕。</li> <li>● 有咬口的焦糖和拖肥糖類糖果。</li> </ul>

- 軟身蛋糕。

## 其他

應攝入的其他飲食	應避免的其他飲食
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鹽、胡椒、茄汁、芥末、香草和香料。</li> <li>● 蜂蜜、糖和糖替代品。</li> <li>● 朱古力糖漿和楓糖漿等所有糖漿。</li> <li>● 鮮忌廉。</li> <li>● 無核果凍、果醬和蜜餞。</li> </ul>	

## 7 級易咀嚼飲食的餐單範例

請參考這些餐單範例，了解如何安排自己的 7 級易咀嚼飲食。

7 級易咀嚼飲食餐單	
早餐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加入全脂牛奶的粟米片</li> <li>● 炒蛋</li> <li>● 濕餅乾</li> <li>● 咖啡或茶</li> <li>● 柑橘</li> </ul>
上午小食	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雲呢拿乳酪</li> <li>● 一杯提子汁</li> </ul>
午餐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 意粉上的燉牛肉</li> <li>● 罐裝水果沙律，配上茅屋芝士醬</li> <li>● 一杯全脂奶</li> <li>● 一杯果汁</li> </ul>
午後小食	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 低脂茅屋芝士哈密瓜</li> </ul>

晚餐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 嫩雞肉配 2 大匙肉汁</li> <li>● 熟薯仔</li> <li>● 熟甘筍</li> <li>● 罐裝水蜜桃粒</li> </ul>
傍晚小食	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 士多啤梨布甸</li> </ul>

## 於飲食中添加更多卡路里的小貼士

- 每日吃 6 至 8 次小餐，而不是 3 次主餐。
- 在冰沙、奶昔、麥片和乳酪中添加 2 至 4 湯匙罐裝椰奶或椰漿以攝取額外熱量。您也可以將其添加到菜餚以增加卡路里、風味和水分。
- 選擇濃湯而不是清湯。
- 選擇布甸和吉士而非 Jell-O 等果凍甜品。
- 在食物中添加醬汁、肉汁、牛油或額外的植物油。
- 飲用利用乳酪或雪糕製成的水果奶昔或水果冰沙。
- 用牛奶或果汁製作冰塊。將這些高熱量的冰塊用於冰沙，或加入奶昔使其保持冰凍。當這些冰塊融化時，飲品熱量將會增加。
- 飲用全脂牛奶、奶昔或消毒蛋奶酒等高熱量飲品。
- 將 Ensure® 或 Boost® 等口服營養補充品用作冰沙和奶昔中營養豐富的高熱量液體基質。
- 在冰沙、茶、乳酪、熱穀物、奶昔或雪糕中加入蜂蜜。
- 在食物中加入酸忌廉、半脂忌廉、濃忌廉或全脂牛奶。您可以

將其加入薯蓉、醬汁、肉汁、穀物、湯類和砂鍋菜。

- 在菜餚或冰沙中加入牛油果並將其混合。
- 將花生醬等堅果醬混合到奶昔和冰沙中。

## 於飲食中添加更多蛋白質的小貼士

- 將純豆腐蓉加入煮熟的蔬菜、湯或冰沙中。如您難以食用動物蛋白質，則可以食用豆腐來代替雞肉或肉類。
- 將熟蛋碎加入湯品、清湯和熟蔬菜中。
- 在冰沙、忌廉醬或任何需要使用酸忌廉的地方使用純全脂希臘乳酪。
- 在液體和奶昔中使用原味蛋白粉，例如乳清蛋白粉或豌豆蛋白。
- 加入全脂乳清芝士可潤濕蛋糕，同時增加熱量和蛋白質。
- 在冰沙或果蓉中加入茅屋芝士。

## 聯絡資料

如有疑問或想要預約與臨床營養師會面，請致電 212-639-7312。

如欲獲取更多資源，請瀏覽 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，於我們的虛擬圖書館內搜尋。

---

How To Follow a Level 7 Easy-to-Chew Diet - Last updated on April 25, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 持有並保留所有權利